


615.108
02338

615.108

02338

Photo Album.



อินทร์

ในงานฌาปนกิจศพ

เภสัชกรหญิง เสมอจิตต์ รัตนพานิช

ณ ฌาปนสถานวัดธาตุทอง

วันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑

เวลา ๑๔.๐๐ น.

เลขหมู่ ๖๑๒.10๘
๑ 2๒3๕

เลขทะเบียน 016213



เกสัขกรหยัง เสมอจิตต์ รัตนพานิช

ชาตะ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘

มรณะ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑

สิริรวมอายุได้ ๕๒ ปี ๘ เดือน

ประวัติ

เกษักกรหญิง เสมอจิตต์ รัตนพานิช

คุณเสมอจิตต์ รัตนพานิช เกิดเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.
2468 อายุปัจจุบัน 52 ปี 8 เดือน เป็นบุตรของหลวงอักษร
สารกิจ และ นางลม่อม อักษรสารกิจ

มีพี่น้องร่วมบิดา มารดา รวม 7 คน คือ

1. นายประยูร อักษรสารกิจ (ถึงแก่กรรม)
2. คุณหญิงประมวญ พันธูลาภ
3. น.ส.ประมุล อักษรสารกิจ (ถึงแก่กรรม)
4. นายเสวี อักษรสารกิจ (ถึงแก่กรรม)
5. นางสมุทร อักษรสารกิจ
6. นางเสมอจิตต์ รัตนพานิช
7. นางสมร อักษรสารกิจ

ชีวิต เสมอเยาว์วัย เกิดที่จังหวัดยะลา ในขณะที่คุณพ่อรับ
ราชการเป็นคลังจังหวัดและต่อมาได้ติดตามคุณพ่อ ซึ่งย้ายไป
เป็นคลังจังหวัดอื่น ๆ อีกหลายจังหวัด

- การศึกษา — โรงเรียนเซนต์ยอห์น
 — โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 — จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 — มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ได้รับพระราชทานปริญญาตรี เกษัตริศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2494

ชีวิตสมรส เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2500 ได้ทำการสมรสกับนายแพทย์ประดิษฐ์ รัตนพานิช นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลนครราชสีมา (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายแพทย์พิเศษผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครราชสีมา)

มีบุตร 1 คน คือ น.ส.ติชยา รัตนพานิช ขณะนี้กำลังศึกษาในชั้น ม.ศ. 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ชีวิตและประวัติการทำงาน หลังจากสำเร็จการศึกษา ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร เกษัตริศาสตรบัณฑิตแล้ว คุณเสมอจิตต์ รัตนพานิช ได้เข้าทำงานครั้งแรกในตำแหน่ง “เภสัชกร” ประจำสถานพยาบาลของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเวลา 6 ปี เมื่อสมรสกับนายแพทย์ ประดิษฐ์ รัตนพานิชแล้วได้ลาออกจากธนาคารแห่งประเทศไทย ติดตามสามีไปอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา และเข้าทำงานในตำแหน่ง “ผู้รักษาเงิน” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครราชสีมา


คุณเสมอจิตต์ รตนพานิช ได้รับการแต่งตั้งโอนย้าย
เปลี่ยนตำแหน่งตามลำดับดังนี้

- 1 กันยายน 2512 ได้รับแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยผู้จัดการ”
ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขานครราชสีมา
- 1 มกราคม 2514 ได้รับแต่งตั้งเป็น “รองผู้จัดการ” ธนาคาร
กรุงไทย จำกัด สาขานครราชสีมา
- 1 กุมภาพันธ์ 2517 ได้รับแต่งตั้งเป็น “ผู้จัดการ” ธนาคาร
กรุงไทย จำกัด สาขานครราชสีมา
- 1 สิงหาคม 2519 โอนย้ายมาเป็นพนักงานประจำฝ่าย ฝ่าย
พนักงาน สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุง-
ไทย จำกัด
- 10 สิงหาคม 2519 ได้รับแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย”
ฝ่ายพนักงาน สำนักงานใหญ่ ธนาคาร
กรุงไทย จำกัด จนถึงปัจจุบัน

คุณเสมอจิตต์ รตนพานิช ได้ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็ง
ของตับ ซึ่งส่งผลลุกลามมาจากโรคมะเร็งของเต้านมได้เข้า
รับการรักษายาบาลที่ โรงพยาบาลรามาศิริหลายครั้งจนสุด
ความสามารถที่แพทย์จะเยียวยารักษาได้ และได้ถึงแก่กรรม

อย่างสงบ เมื่อเวลา 17.50 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม
พ.ศ. 2521


คุณเสมอจิตต์ รัตนพานิช เป็นผู้ที่ได้ประกอบแต่คุณ
งามความดี มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่เป็น
เบื้องนิตย์ ดังนั้นการจากไปของ คุณเสมอจิตต์ รัตนพานิช จึง
ยังความเศร้าโศก และความอาลัยมาสู่ญาติมิตร และผู้ได้
บังคบบัญชา ตลอดถึงผู้ใกล้ชิดคุ้นเคยอย่างสุดซึ้ง



กบคำชวต นายแพทย์ประดิลฐ์ รตนพานิช



ในระหว่างครอบครัว



รูปพระราชทานเหรียญกาชาด จาก
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี



วันออกเดินทางจากธนาคารกรุงไทย เพามา
รับตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด
สาขานครราชสีมา



การบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศพ
เภสัชกรหญิง เสมอจิตต์ รัตนพานิช
ณ ศาลาเสถียรไทย วัดราชทอง

รายการสวดพระอภิธรรมศพ

เกษักรหญิง เสมอจิตต์ รัตนพานิช

ณ ศาลาเสถียรไทย วัดธาตุทอง

เวลา 19.30 น.

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2521

คุณแม่ทิพย์ รัตนพานิช และลูก ๆ

โรงพยาบาลนครราชสีมา

นายแพทย์ประสาธ-วิสุนีย์ ปราสาททองโอสธ

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2521

คุณกำธร — คุณหญิงประมวญ พันธุ์ลาภ

ร.ต.อ. เข็ญกุล พันธุ์ลาภ

คุณสมุทรรักษ์ อักษรสารกิจ

คุณสมร อักษรสารกิจ

วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2521

เพื่อน ๆ เกษักร

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2521

ธนาคารกรุงไทย จำกัด “สำนักงานใหญ่”

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2521

คุณพนัส พันธูลาภ

คุณยรรยง รังสิมันต์

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม

บริษัท แอตแลนติกเทรคดิง จำกัด

คุณสมพร เทียนชัย

วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2521

ธนาคารกรุงไทย จำกัด ฝ่ายพนักงาน และ สาขา

นครราชสีมา และสาขาด่านขุนทด

บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2521

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มแลนด์

คุณเฉลิม – ประเทือง การปลื้มจิตต์

วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2521

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

เวลา 13.00 น. มาตีกา บังสกุล

เวลา 14.00 น. ประชุมเพลิง

ขอบอบพระคุณ

ครอบครัวของ นายแพทย์ประดิษฐ์ รัตนพานิช ขอ
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ในความกรุณาจากท่าน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เปรม บุรี

แพทย์หญิง สมปอง รักษาสุข

คณะแพทย์ โรงพยาบาลรามธิบดี

คุณวราภรณ์ โกมารกุล ณ นคร

พยาบาลประจำตึกศัลยกรรมพิเศษ

ตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาล
รามธิบดีได้รับความสดวก และการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี

นายแพทย์ประดิษฐ์ รัตนพานิช

ขอขอบพระคุณ

ครอบครัว ของ นายแพทย์ ประดิษฐ์ รัตนพานิช
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ในความกรุณาจากท่านทั้งหลาย
ที่มีต่อคุณเสมอจิตต์ รัตนพานิช โดยการเยี่ยมเยียน และ
เอื้ออารีด้วยประการต่าง ๆ ในระหว่างกำรเจ็บป่วยของคุณ
เสมอจิตต์ ตราบจนกระทั่งเสียชีวิต

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้กรุณามาร่วมในพิธี ตลอด
จนเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม พร้อมทั้งได้วาง
พวงหรีด นับเป็นการให้เกียรติแก่ผู้วายชนม์ ตลอดจนญาติ
พี่น้องเป็นอย่างยิ่ง

ครอบครัวของนายแพทย์ประดิษฐ์ รัตนพานิช รู้สึก
สำนึกในความกรุณาและจะระลึกถึงตลอดไป หากมีสิ่งหนึ่ง
ประการใด ขาดตกบกพร่อง กราบขออภัยไว้ ณ ที่นด้วย

นายแพทย์ ประดิษฐ์ รัตนพานิช

19/14 พยพอมพล

ศกศพรว 15

8 พ.ค. 2521

กราบเรียนฝ่ายที่เคารพทั้งฝ่ายหญิง

ดิฉันจะจดหมายมากราบนลขครั้ง ว่า ดิฉัน
คงไม่มีโอกาสได้ยื่นใฝ่ฝ่ายอีกเสียดหะคะ คิดว่าภายใน
3 เดือนคงจะถึงแต่ดิฉันคิดว่าถ้าไม่ไม่นานก็คงจะรอสา
น่วยไม่เรื้อง ๆ ก่อนจนกว่าจะตาย ฝ่ายพวกคนใหม่หะ
หะคะ อีปากวันใช้ฝ่ายมากค๊ะ เแต่จนใจจริง ๆ ตอนนี
ท้องมีน้ำ เหมือนคนเจ็บ นังนานไม่ได้ คงไม่
มีฟลุคมาวันใช้ฝ่ายนรอกค๊ะ คงจะต้งนอนพักที่
น้ำหมากกว่า วันนีไม่ค่อเง้ออ้อ ค่อบยัวัวขึ้น
แต่ไม่บอปากวันนรอกค๊ะ เทาเนลลิ่ง นมอให้หม
มาก

กราบด้วยรักจ.เกศ

เกศกรหญิงเสมอจิตต์
(เสมอจิตต์ รัตนพานิช)

คำไว้อาลัย

“แอ่ว..... ลูกรัก”

ขอให้บุญกุศลที่แม่ได้ทำมาแล้ว ประกอบกับที่ลูกได้
สร้างในชาตินี้ จงช่วยส่งให้ลูกไปสู่สุคติในสัมปรายภพเถิด
ด้วยรัก — อาลัยยิ่ง

จากแม่
ทิพย์ รัตนพานิช


คุณแอ้ว ที่นับถือ

ผมรู้จักคุณแอ้ว ก่อนที่จะแต่งงานกับคุณหมอประดิษฐ์ เมื่อคุณแอ้วแต่งงานแล้ว ได้ไปอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาได้รู้จักกันตอน และคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ได้พบปะวิสาสะกัน อยู่ตลอดมา จนกระทั่งผมย้ายเข้ากรุงเทพฯ จึงได้ห่างกันไปบ้าง ภายหลังได้ทราบว่า คุณแอ้วไม่สบาย ต้องมาผ่าตัด และอยู่รักษาที่โรงพยาบาลรามารัตน์ ก็ได้ไปเยี่ยมถามข่าวคราวกัน รู้สึกว่าคุณแอ้วมีกำลังใจดีมาก ผมก็โมทนาสาธุ ด้วยที่ทราบว่าอาการทุกอย่างดีขึ้น แต่โรคพยาธิไม่เคยปราณีใคร โดยเฉพาะโรคที่รักษาให้หายได้ยากด้วยแล้วคุณแอ้วก็ประสบเช่นนี้ สุดท้ายทุกคนแม้แต่แพทย์เองซึ่งได้ใช้สติปัญญาเต็มความสามารถ ก็ไม่สามารถจะช่วยคุณแอ้วได้ ในระยะหลังๆ นี้ทราบว่า คุณแอ้วเป็นมาเกิน และเวียนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้าง ตามที่ต่างๆ ที่คิดว่าจะรักษาได้บ้าง ผมเองได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล แต่ไปคราวใดก็ได้ทราบว่า คุณแอ้วกลับบ้านแล้ว ในช่วงระยะท้ายๆ นี้ ผมไม่กล้าไปเยี่ยม

เพราะเกรงว่าจะพูดอะไรกับคุณแอ๋วไม่ออก ทั้งเสียใจที่ไม่สามารถจะช่วยอะไรคุณแอ๋วได้ด้วย ได้แต่คอยถามข่าวคราวจากข้างนอก และก็ได้พบคุณหมอประดิษฐ์ถามข่าวคราวอยู่เสมอ ทราบว่าไม่มีอะไรดีขึ้น อาการมีแต่ทรุดลงตามลำดับ

ถ้าคุณแอ๋วมีทางใดที่สามารถทราบข้อความในจดหมายนี้ได้ ก็ขอได้ทราบด้วยว่า ผมและทุกคนที่รู้จักคุณแอ๋วยังอาลัยและคิดถึงคุณแอ๋วอยู่เสมอ ความดีใดๆ ที่คุณแอ๋วได้สร้างสมในชาตินี้ จงได้รับตอบสนอง และได้ประสบในโอกาสอันพึงจะได้รับนั้นเถิด

ด้วยความอาลัยและคิดถึง



(นายแพทย์น่วม เศรษฐจันทร์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำไว้อาลัย

การเกิด แก่ เจ็บ แล้วตาย เป็นของธรรมดา
สำหรับทุกคน ซึ่งไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้ และสิ่งที่เหลือ
หลังจาก ความตาย ก็คือ คุณงามความดีที่ได้กระทำไว้
ครึ่งยังมีชีวิตอยู่ เมื่อญาติสนิท มิตรสหาย หรือผู้เคยอยู่
ร่วมทำงานในสำนักเดียวกันได้ล่วงลับไปแล้ว ก็ย่อมมีความ
เศร้าโศกเสียตาย และคิดถึงการจากไป โดยมีคาดฝันมา
ก่อน ย่อมทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจเพิ่มพูนยิ่งขึ้น แต่
หากการจากไปอย่างชนิดที่คาดได้ล่วงหน้ามาก่อนก็จะยังความ
เศร้าสลด เกิดความระนทใจยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ ดังเช่นการ
จากไปอย่างไม่มีวันกลับมาของ คุณเสมอจิตต์ รัตนพานิช
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด ใน
กรุง

คุณเสมอจิตต์ รัตนพานิช เป็นพนักงานเก่าแก่ผู้หนึ่ง
ของธนาคารกรุงไทย จำกัด มีอายุการทำงานจะครบ 20 ปี
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2521 และเหลืออายุงานที่จะต้องทำ

ได้ออกถึง 7-8 ปี หากว่า โรคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียนจน
 ทำให้ต้องจากกันไปก่อนเวลาอันควร ก็คงจะยังไม่ต้องเขียน
 คำไว้อาลัยเร็วเช่นนี้

จากการถูกคุกคามอย่างไม่มีความปราณี ของโรคร้าย
 “มะเร็ง” คุณเสมอจิตต์ รัตนพานิช ก็ต้องโอนย้ายเปลี่ยน
 ตำแหน่ง จากผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานคร
 ราชสีมา มาเป็นพนักงานประจำฝ่าย ฝ่ายพนักงาน และได้
 รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย” ฝ่ายพนักงาน เมื่อ
 วันที่ 10 สิงหาคม 2519 ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามความประสงค์
 ของคุณเสมอจิตต์เอง ที่ตั้งใจจะรักษาร่างกายอยู่ในกรุงเทพ-
 มหานคร เพราะมีสถานพยาบาลที่ตรวจเช็คร่างกาย และเข้า
 รับการรักษาได้ทันที

ตลอดระยะเวลาที่คุณเสมอจิตต์ รัตนพานิช มาดำรง
 ตำแหน่งผู้ช่วยของข้าพเจ้า คุณเสมอจิตต์เป็นผลจากความตั้งใจ
 ในการปฏิบัติงานด้วยความขยันขันแข็ง ช่วยแบ่งเบาและลด
 ภาระงานของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างมาก ทั้งที่ตัวเองทราบว่า
 โรคมะเร็งคุกคาม ในบางครั้ง ต้องล้มป่วยเข้าโรงพยาบาล
 ก็ยังมีความห่วงใยในเรืองงาน ได้ติดตามในเรื่องกิจการงาน
 ตลอดเวลา และเมื่อทุเลาจากการป่วย ก็รีบกลับมาทำงานโดย

ทันที แทนที่จะพักผ่อนให้เต็มที่ตามสิทธิของตน พุดถึงน้ำ
ใจแล้ว คุณเสมอจิตต์เป็นผู้สนใจโอบอ้อมอารีกับพนักงานผู้
ได้บังคับบัญชา คุณเสมอจิตต์จะแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามที่ถูกและควร ให้ความสนใจสนทนเป็นกันเอง
และแสดงความเมตตาต่อพนักงานผู้น้อย จึงเป็น तरहและเคารพ
ของพนักงาน

และในสุดท้าย ความตาย ก็มาพรากคุณเสมอจิตต์
รัตนพานิช จากเราไปด้วยโรคภัยที่ไม่มีความปราณีต่อผู้ใด
แต่คุณงามความดีที่คุณเสมอจิตต์ได้สร้างสมไว้ในภพนี้ จะ
เป็นอันสูงส่งส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้คุณเสมอจิตต์ ประสพใน
ภพหน้า ข้าพเจ้าและพนักงานในฝ่ายพนักงานทุกคน รู้สึก
เศร้าสลดและอาลัยต่อการจากไป ของผู้ที่เคยอยู่ร่วมที่ทำงาน
เดียวกันเป็นอย่างมาก ขออำนาจบุญกุศล จงดลบันดาลให้
คุณเสมอจิตต์ รัตนพานิช จงไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

ด้วยความรักอาลัยอย่างยิ่ง

(สมชาย โปษยานนท์)

ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด. สำนักงานใหญ่

“รำลึกถึงเสมอจิตต์”

เสมอจิตต์ เป็นน้องที่รัก และมีความใกล้ชิดกับภรรยา
ข้าพเจ้ามาก เมื่อเธอแต่งงานกับคุณหมอประดิษฐ์ รัตนพานิช
เมื่อ พ.ศ. 2500 แล้ว เสมอจิตต์ก็ได้ขึ้นไปอยู่กับสามที่จังหวัด
นครราชสีมา และได้เข้าทำงานที่ธนาคารกรุงไทย สาขา
นครราชสีมา เสมอจิตต์เป็นคนมีน้ำใจดีต่อญาติพี่น้อง และ
เพื่อนฝูง จึงเป็นที่รักของบรรดาญาติพี่น้องของสาม และเพื่อน
ร่วมงานทุกคน เมื่อราว พ.ศ. 2513 เสมอจิตต์นำดิษยา ลูก
สาวคนเดียวของเธอมาอยู่ที่บ้านข้าพเจ้า เพื่อเข้าเรียนที่โรง
เรียนวัฒนา ในระหว่างที่ดิษยามาอยู่กับข้าพเจ้า เสมอจิตต์วันเว้น
มาเยี่ยมลูกแทบทุกอาทิตย์ เสมอจิตต์เป็นผุ้มีความรักบุตรมาก
ดิษยาอยู่กับข้าพเจ้าได้ประมาณ 7 ปี เสมอจิตต์ก็ลงมาปลูกบ้านให้
ลูกที่ลาดพร้าว และขอย้ายมาอยู่ธนาคารกรุงไทย ที่กรุงเทพฯ
เพื่ออยู่ดูแลลูก

เมื่อเดือน มิถุนายน 2519 เสมอจิตต์ประสบเคราะห์
กรรมที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน เป็นโรคร้ายที่ต้องทำการผ่าตัด

ที่โรงพยาบาลรามารัตน์ เมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้ว ก็มีชีวิตอยู่บนความทุกข์ เพราะความโหดร้ายของโรคซึ่งวงการแพทย์ทั้งโลกยังไม่สามารถเอาชนะได้ เสมอจิตต์เอาชนะงานชนะใจเพื่อน และชนะใจตัวได้ เพราะคุณความดี แต่ก็ต้องมาแพ้โรคร้าย ทำให้เธอต้องเข้าออกโรงพยาบาลรามารัตน์ หลายครั้งหลายหน เมื่อจะเข้าโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายก่อนถึงแก่กรรมไม่ถึงเดือน เสมอจิตต์ซึ่งเอาชนะใจตัวได้ ก็บอกกับพี่ว่าไปคราวนี้ จะไม่มีวันได้กลับบ้านแล้ว

ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมเสมอจิตต์ เพราะเสมอจิตต์ไม่เคยลืมข้าพเจ้าและพี่ แม้จะอยู่ห่างไกล ก็สนใจใฝ่ถาม และมาเยี่ยมเยียนทุกข์สุขมิได้ขาด ขอบารมีแห่งบุญกุศลที่เธอได้บำเพ็ญคุณงามความดีมาตลอดชีวิตจงเป็นพลวบจยิตลบันดาลหนุนนำให้วิญญาณของเธอ ไปสู่สุคติ ชั่วฉับนัตถ

กำธร พันธูลาภ

(นายกำธร พันธูลาภ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

จากพี่.....

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2519 พี่และเพื่อน ๆ นัด
กันจะไปเที่ยวพักผ่อนที่บึงบัววัดไร่ขี้อยู่แล้ว แอ้วมาบอก
ว่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลทำการผ่าตัด พี่หมดความสนุกทันที
ไม่อยากไป แต่คุณสร้อยสุตาโอสถานนท์น้องสาวหมอประดิษฐ์
ได้กรุณาบอกแก่พี่ว่า จะดูแลแอ้ว ให้อย่างดีพี่ไม่ต้องเป็นห่วง
และคิดว่าคงจะไม่เป็นโรครุนแรงก็ได้ ทำให้พี่สบายใจขึ้น

พี่เดินทางไปถึงหาดใหญ่พักได้ 2 วัน ก็เดินทางไป
เที่ยวบึงบัวพักที่นั่น 3 วัน เดินทางกลับมาหาดใหญ่มาถึงที่
พักก็มีโทรเลขจากหมอประดิษฐ์รออยู่ บอกว่าแอ้วทำการผ่าตัด
ใหญ่ต้องการพบ พี่รีบเดินทางเข้า ก.ท. ทันที เพื่อน ๆ ก็
เดินทางไปเที่ยวปัตตานี นราธิวาส ยะลาในวันรุ่งขึ้น

พี่มาถึงโรงพยาบาลมาพบแอ้วรู้สึกใจหาย ทราบ
จากคุณหมอวิฑูรย์ โอสถานนท์ที่กรุณาบอกให้พี่ทราบว่าแอ้วเป็น
โรคที่เป็นอันตรายเพราะเป็นจากท่อน้ำนม และปลอบใจพี่

๕๘ พักพยายามทำใจ แต่ก็ไม่ได้สำเร็จและคิดทบทวนว่าแอมคงจะอยู่
กับพ่อกไม่นานนัก

ในชีวิตของแอ้วเธอเป็นคนมีบุญ และประกอบแต่ความ
ดีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อญาติและเพื่อนฝูงเท่าที่จะทำได้ บุญได้
สนองตอบแอ้ว เธอมีสามทศ ตลอดจนคุณแม่หมอประดิษฐ์
ได้รักกรุณาเธอเสมือนลูก น้องสาวทุกคนของหมอประดิษฐ์
ได้รักเธอเสมือนพี่ เอาใจใส่ดูแลมาเยี่ยมแล้วเวลาเจ็บใน
ระยะยาวของเธอ ความดีนั้นจะจารึกในหัวใจพี่ไม่ลืม

๓ ๖๒๒ ๒ ๒ ๑๕๕
แอมวณบงคบบญชาทตตงแตทำงานอยุท โคราช ยาย
ลงมาทำงานที่ ก.ท. ห้วนหน้าผาคุณสมชาย โพษยานนท์ ได้
กรุณาмаเยี่ยมดูแลในเวลาเข้าโรงพยาบาลทุกครั้ง เพื่อนร่วม
งานและเพื่อนร่วมรุ่นในเวลาเรียนของเธอได้สละเวลามาเยี่ยม
มิไดขาด ผศทเห็นดเหน้อยมากคอคคุณสมบัติ ค้มไต่อยู่ ไต้
กรุณาช่วยเหลือเวลาทแอมต้องการททุกอย่าง อยุตลอดเวลา พ
รู้สึกเต็มตนไม่ทราบจะกล่าวความรู้สึกในใจ สุดท้ายจะบรรยาย
ไต้ มิตรสหายและผู้ร่วมงานที่โคราขก็ได้กรุณามาเยี่ยมเธอ
เสมอและอกผทนงทพจะต้องระลึกถึงคอคคุณวรารณ์ โกมารกุล
ณ นคร หัวหน้าตกศลยกรรมพิเศษ ชั้น 5 ของโรงพยาบาล

รามาศิบตีกรุณาแถมมาก ได้ดูแลการเจ็บป่วยทุกครั้งที่เขาอยู่
ในโรงพยาบาล และพยาบาลทุกคน พี่ขอขอบพระคุณไว้
ณ ๘๕ ๕
ณ ทนด้วย

การตายเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้
ต้องเป็นไปตามวาระและบุญกรรมที่ได้สร้างสมมา แต่กรรมดี
ของเธอได้ทำไว้มาก การจากไปของเธอทำให้ทุกคนได้
อาลัยถึง

พี่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง
หลายจงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของเธอ ซึ่งอยู่ ณ แห่งหน
ตำบลใดก็ตาม จงไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ถ้าชาติหน้ามี
จริง ขอให้ได้เกิดเป็นน้องของพอก

คุณหญิงประมวญ พันธุลาก

แต่น้ำแ้วที่รักยิ่งของหลาน

ตั้งแต่หลานจำความได้ ก็อยู่ในความปกครองของน้ำ
แ้วตลอดมา เพราะคุณพ่อคุณแม่ต้องไปราชการต่าง
จังหวัด น้ำแ้วเป็นคนโอบอ้อมอารี จิตใจเมตตา กรุณา ไม่
เคยโกรธและเกลียดใคร สร้างบุญสร้างกุศลทำแต่กรรมดี
ตลอดชีวิตของน้ำแ้วจึงมีแต่คนรัก แต่อนิจจังมันไม่เที่ยง
น้ำแ้วล้มเจ็บลงและป่วยเรื่อยมา ในที่สุดก็จากหลานไป

ในโอกาสสุดท้ายนี้ หลานขอวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ตลอดจนกรรมดีของน้ำแ้วได้ทำมา จงส่งดวงวิญญาณของ
น้ำแ้วให้เป็นสุข อย่าได้คิดทวงเบียดเบียน

จากหลาน

ร.ต.อ. เชิดกุล พันธุลาก

สว.ผ. สอบสวน กก.กิล.

คุณเสมออดีตที่รัก

ฉันเสียใจนัก ไม่คิดเลยว่า คุณจะจากไปรวดเร็วเช่นนี้
ฉันมีแต่ความเศร้าอาลัยระลึกถึงคุณ คุณไปบ้านฉันเราได้พูด
คุยกันก่อนคุณไม่สบายครึ่งหลังสุดเห็นจะเป็นเวลาสัก 2 เดือน
ได้กระมัง ครั้นเมื่อคุณไม่สบายที่บ้านก็ไม่มีโอกาสไปเยี่ยม
คุณซึ่งระยะนั้นฉันเองมีธุระที่ต้องจัดการหลายเรื่อง ประกอบ
กับเจียบลูกสาวได้มาเยี่ยมคุณอยู่เสมอแล้ว ฉันเองตั้งใจว่าจะ
มาคุยกับคุณให้มากที่สุดแต่แล้วความตั้งใจของฉันก็ไม่อาจเป็น
ไปได้ เมื่อฉันมาเยี่ยมคุณใน 3 วันหลังสุดท้ายนี้ คุณจะ
ทราบหรือไม่ว่าฉันเสียใจมากที่ไม่ได้พูดคุยกับคุณอีกแล้ว

ฉันขอให้ดวงวิญญาณของคุณ จงไปสู่สุคติภพ อันสูงส่ง
สมกับที่คุณได้ประกอบแต่คุณงามความดีตลอดมา.

รักเสมอ

พนอ บัณฑิตย์

คำไว้อาลัยแด่.....แ้วเพื่อนรัก



การจากไป ของแ้ว ทำให้เรา เสียเพื่อน รักไป หนึ่งคน
เมื่อครั้งที่เรียนเกสซ์เราจะไปไหน ๆ ด้วยกัน ดูหนังสือด้วยกัน
ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลานานถึง 30 ปีมาแล้วเรายังรู้สึกเหมือน
ว่าไม่นานมานี้เอง แ้วเป็นคนที่มีอารมณ์ขันขบขันอยู่เสมอและ
คอยช่วยเหลือเพื่อน ตั้งนั้นแ้วจึงมีเพื่อนมาก เมื่อเราทราบ
ว่าแ้วป่วยอยู่ที่ ร.พ. เราก็ได้ไปเยี่ยมเป็นบางครั้ง บางคราว
จนกระทั่งออกจาก ร.พ. และกลับบ้านไปทำงานเป็นปกติ เรา
ดีใจมากที่แ้วหาย แต่หาหนักไม่ว่าอีกไม่ช้าโรคอันตรายที่
แ้วเป็น มันจะกลับมากำกัดอีก จนกระทั่งวันหนึ่งทราบจาก
เพื่อนว่าแ้วเข้า ร.พ. อีกแล้วและเป็นมาก เรากลับไปเยี่ยมที่
ร.พ. และยังได้พูดคุยกับแ้วเล็กน้อยเพราะแ้วบอกว่าเหนื่อย ต่อ
มาอีก 2 วันเราไปเยี่ยมปรากฏว่าแ้วเป็นมากจนพูดไม่ได้อาการ
ของโรคมะเร็งเป็นโรค ที่ทรมาณมากแต่แ้วก็มีบุญ ไม่เจ็บปวด
เหมือนคนอนกะสักระสายเป็นบางครั้งบางคราว เรายินดี
ด้วยความสงสารแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ แ้วจ๋า! แ้วจะรู้หรือ

แปลว่าเพื่อน ๆ ที่ ไปเยี่ยมบ่นสงสารกันทุกคน เราขอให้
 วิญญาณของแ้วจ้งไปสู่สุคติในภพอื่น และสมความ ปราบณา
 ทุกอย่างดั่งที่มนุษย์ในภพนี้เขาเรียกว่าสวรรค์ เราขออาราธนา
 ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก หากชาติหน้ามีจริงขอให้
 เราเกิดเป็นเพื่อนรวมกันอีก.

วิบูลย์ศรี รักตะวัต

พี่แฉ่วที่เคราฟ

ตลอดเวลาร่วม 20 ปี พี่แฉ่วอยู่โคราช พี่ทำหน้าที่
เป็นพี่ตบของน้อง ๆ เสมอ พี่เป็นกันเองกับน้องทุกคน คอย
ช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อมีโอกาสนั้น เป็นที่พึ่งของน้อง ๆ ตลอดมา

พี่เป็นคนอารมณ์ดี ร่าเริง เบิกบาน แจ่มใส คุยสนุก
เป็นกันเอง และมีอารมณ์ขัน ยามใดที่ใครมีทุกข์หรือเดือด
ร้อน ไม่ว่าจะเรื่องใด ๆ เมื่อได้พูดคุยปรับทุกข์กับพี่ ทุกข์
นั้นก็บรรเทาเบาบางลง เสียงหัวเราะอันสดใสของพี่ เสมือนยา
ที่รักษาทุกข์ทางใจได้อย่างวิเศษ อริยาบถเหล่านั้น ยากที่จะ
ลืมเลือนไปจากพวกเรา

เมื่อน้อง ๆ ทราบข่าวว่าพี่เจ็บป่วย ต่างก็พากันห่วงใย
ได้ถามอาการ และแวะเวียนเยี่ยมเยียนถามข่าวอยู่เสมอได้
ขาด เราต่างภาวนาขอให้พี่หายวันหายคืน ทั้ง ๆ ที่รู้ว่า
ไป ได้ยาก...และเป็นไป ไม่ได้เลย...แต่เราก็ได้แต่หวัง หวัง
ว่าพี่จะอยู่กับพวกเรานาน ๆ นานที่สุดเท่าที่จะนานได้...

แต่แล้ว....ทุกสิ่งทุกอย่างก็เดินไปตามวิถีทาง แห่งความ
จริง ซึ่งแน่นอนที่สุด มันเป็นความจริงที่ ไม่อาจจะหลีกเลี่ยง
แต่มันก็ดูรวดเร็ว เกินไป สำหรับ พี่แ้ว ของน้อง ๆ เร็วเกินที่
พวกเราจะรับได้ แล้วจะไม่ให้พวกเราใจหายได้อย่างไร

หากจะมีญาณวิเศษใดก็ตาม ขอให้พี่ได้บอกว่าพวกเรา
ยังรักอาลัย ระลึกถึงพออยู่เสมอ....

ระลึกถึงพี่ “เสมอจิตต์”

อาลัยพียงแล้ว	ยามลา
น้องเกสรราชสีมา	สุดกลน
ชลเนตรเอ่อนัยนา	คราคิด ถึงพี่
“เสมอจิตต์” จิตนน	เนาใกล้ ใจเสมอ

จากน้อง ๆ

เกสรจักร นกรราชสีมา

บอจดำนามเธอ “เสมอจิตต์”

มีน้ำใจประเสริฐล้ำค่ากล่าวขาน

दानการงานกร่วมด้วยช่วยแบ่งผัน

เคยทำงานการเป็นอยู่ร่วมกัน

มีสมพันธจิตมิตรทช่อตรง

ร่วมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลงานสิ้นหลัง

เป็นกำลังเมตตาจิตแห่งกุศล

ช่วยชีวิตมนุษย์....ปณฺชน

มีสขปล้นเศร้าหายคลายรำพึง

แต่บัดนี้....

....โอ้อาลัยใจหายมาตายจาก

ความหลังฝากทิ้งไว้ให้คิดถึง

คุณความดีที่ทำความดีจริง

พวกเราชงแก่ใจไม่ลืมเลือน

เคยร่วมงานนานมาแพทย์อาสา

รู้ดีว่าน้ำใจยากใครเหมือน

สุดประเสริฐเลิศล้ำน้ำใจเตือน

ถึงวันเดือนปีผ่านนานเท่าใด

“อาลัยพี่แล้ว”

พี่แหว่ทรกและเคารพของเอียดได้จากไปแล้วด้วยความ
สงบ อย่างไม่มีวันกลับคืนมาอีก แม้เราจะทราบดีว่าสังขาร
ย่อมเป็นอนิจจัง เปลี่ยนแปลงแตกดับไปในที่สุด แต่เอียดก็
อดที่จะคิดถึงและเศร้าสลดเสียใจไม่ได้ เพราะพี่แหว่ได้จาก
เอียดไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน ในระหว่างที่พี่แหว่มชวตอยู่
พี่แหว่ได้บำเพ็ญตนเป็นตัวอย่างที่ดียิ่ง มีน้ำใจอันประเสริฐ
เยือกเย็น สุขุม รักความสงบ มีใจเป็นธรรม มีเหตุผล โอบ
อ้อมอารี และมีความกตัญญูเป็นเลิศ พี่แหว่คอยเป็นห่วงใย
เอียด ทั้งให้ความคิดเห็นในทางที่ชอบที่ควร ตลอดชีวิตของ
พี่แหว่เกือบจะกล่าวได้ว่า มีความผูกพันทั้งรักและห่วงเอียด
เสมอ นับแต่บัดนี้ต่อไปจะไม่พบพี่แหว่ทรกของเอียดอีกแล้ว ถ้า
ชาติหน้ามีจริงขอให้พี่แหว่ได้เกิดเป็นพของเอียดอีก และขอ
อย่าได้จากกันรวดเร็วเหมือนชาตินี้

ขอให้คุณความดีของพี่แหว่ และกุศลกรรมใดๆ ที่ได้
บำเพ็ญมาแล้วในอดีต ได้โปรดส่งดวงวิญญาณของพี่แหว่ไป
สู่สุคติในสัมปรายภพ ด้วยเทอญ

จาก
น้องเอียด

ตัวรัก และ อาลัย

จาก สกุลรัตน์พานิช

ในช่วงชีวิตของคนเรานั้น เป็นความจริงที่ยอมรับกัน
ว่า สิ่งที่ถูกพินัยอย่างใกล้ชิดนั้น คือ ญาติ สำหรับพวกเรา
พี่น้อง “รัตนพานิช” ซึ่งมีทั้งหมด 7 คน มีพี่ใหญ่คือ พิศิษฐ์
เป็นหลักของบ้าน และของน้อง ๆ เมื่อพิศิษฐ์แต่งงานกับพี่แอ๋ว
พี่แอ๋วก็มาเป็นหลักของพวกเราพร้อมกับพิศิษฐ์ พวกเราทุกคน
รัก และเคารพพี่แอ๋วเช่นเดียวกับเรามาต่อพิศิษฐ์ ยิ่งพี่แอ๋วเป็น
ผู้สนใจเอาอารมณ์คุณธรรมของความเป็นพื้ตลอดระยะเวลาที่มา
ร่วมสกุลของเร พี่แอ๋วเป็นผู้ส่งเสริม และเชิดชูสกุลรัตนพานิช
ตลอดมา จนเราไม่นึกว่าพี่แอ๋วเป็นพี่สะใภ้ของเราเลย พวก
เราคิดว่าเป็นพี่สาวแท้ ๆ

ถึงแม้ว่าความตายจะเป็นสิ่งที่คนเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ทุกคน แต่เราก็ก็นึกใคร่ยอมรับกันนัก เนื่องจากความผูกพัน
ซึ่งกันและกัน ความตายของพี่แอ๋วก็เช่นเดียวกัน ทำความ
ทุกข์โศกแก่พวกเราอย่างสุดซึ้ง ความตายของพี่แอ๋วมาเร็ว

เกินกว่าจะนึก และตั้งใจรับได้ทัน น้องทุกคนต้นตื้นใจเหลือ
เกิน จนไม่ทราบจะหาคำกล่าวอะไรได้มากกว่านี้

ขอบุญกุศลที่พี่แอ้วได้สร้างตลอดเวลา ในช่วงชีวิตคงอยู่
ซึ่งพี่แอ้วได้กระทำมาสม่ำเสมอ ตั้งแต่ทำบุญ ทำทานตามปกติ
จนถึงการทอดกฐิน สร้างพระประธานตามพระอุโบสถ ให้ทาน
แก่คนยากไร้มีน้ำใจอันเป็นกุศลตลอดเวลา จงชลบรรดาลให้
พี่แอ้วได้พบกับความสุขในสัมปรายภพด้วย และหากพวกเรา
ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ และชาติหน้ามีจริง ขอพี่แอ้วจงได้ไป
เกิดเป็นพี่น้องของเราอีกเถิด

อุดมพร— น.พ. ศิริพันธ์ จาตุรงค์กุล

ประดับ— น.พ. ปรีดา คชรัตน์

ศ.ศ. วนิดา— พล.อ.ต.ประพันธ์ ฐูปะเต็มย์

สร้อยสุตา— ศจ. น.พ. วิฑูรย์ โอสถานนท์

ดาวศิริ-- พ.อ. น.พ. บัญญา อยู่ประเสริฐ

คำรงค์— วลลภา รัตนพานิช

กราบคุณบำที่รักและเคารพยิ่ง

หลานรู้สึกละอายใจ หายทั้ง ๆ ที่ทราบว่าจะเกิด แก่ เจ็บ ตาย
เป็นของธรรมดา ทั้ง ๆ ที่เคยเตรียมใจไว้ก่อนแล้ว แต่ความ
เศร้าใจ ความอาลัยระลึกถึงคุณบำนั้นยากที่จะระงับได้ใน
เร็ววัน รุwanบแต่กันไปหลานจะขาดผู้ที่เคยรักใคร่ปรานีแล้ว
คุณบำเป็นผู้ที่มีใจเมตตา กรุณา เป็นที่รักของญาติพี่น้อง
และลูกหลานทุกคน คุณบำมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ยาก
ไร้ผู้พการ ผู้ที่มาขอความช่วยเหลือจากคุณบำย่อมได้รับความ
ช่วยเหลือทุกคน คุณบำจะมีความสุขมากเมื่อได้อุปการะ
ช่วยเหลือผู้อื่นให้สำเร็จไปได้ โดยไม่ได้คิดหวังสิ่งตอบแทน
ซึ่งหลานประจักษ์ในน้ำใจของคุณบำเป็นอย่างดี

ถึงแม้ว่าคุณบำจากไปแล้ว แต่ความรักความเมตตา
ของคุณบำที่มีต่อหลานยังอยู่และคงอยู่ตลอดไป ด้วยอำนาจ
แห่งกรรมดีและจิตใจ อันเป็นบุญกุศล ที่คุณบำสร้างสมมาเป็น

เนื่องนี้จึงเป็นผลานิสงส์ ให้ดวงวิญญาณของคุณปู่ไปสู่สุคติ
ในสัปดาห์ภาพเกิด.

ขอกราบลาด้วยความเคารพรัก

สุนทร บัณฑิตย์ (เจียบ)

น้ำเพชร ชีระพันธ์ (หนู)

เกษนฐา จาตุรงค์กุล (ชมพู่)

นภิสสร จาตุรงค์กุล (บนุ่น)

กราบคุณแม่ที่รักและเคารพของป๋ม

คุณแม่เคยพูดเสมอว่า เราอยู่ด้วยกันเพียง 3 คน คือ พ่อ แม่ และลูก บัดนี้คุณแม่ได้จากป๋มไปแล้ว ป๋มคงเหงาและคิดถึงคุณแม่มาก ป๋มรู้ดีว่า คุณแม่ไม่อยากจากป๋มไปเลย และคุณพ่อก็บอกป๋มว่า คุณแม่เป็นมะเร็ง แต่ป๋มก็ยังมั่นใจว่าคุณแม่คงจะรักษาหาย แต่คุณแม่ก็ได้จากป๋มไปโดยรีบด่วน ซึ่งเร็วเกินไป เกินกว่าที่ป๋มคิดไว้

ขอให้คุณแม่ ซึ่งเป็นที่รัก ของป๋ม ไปสู่ความสุขในภพหน้า หากมีบุญวาสนาร่วมกัน ป๋มจะขอไปเกิดเป็นลูกของคุณแม่อีก

ด้วยความรักคุณแม่อย่างสุดซึ้ง

ป๋ม

(ดิษยา รัตนพานิช)

“อาลัย.....แอ้ว”

เราได้อยู่ร่วมกันมาเป็นเวลาถึง 20 กว่าปี แอ้วทำหน้าที่
ที่เป็นทั้งภรรยาและเพื่อน ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกัน เป็น
แม่บ้านที่ใจกว้าง โอบอ้อมอารีต่อเพื่อนบ้านใกล้เคียง ตัด-
สินใจรวดเร็ว และมีอารมณ์ขัน จึงเป็นที่รักใคร่ของบรรดาเพื่อน
ฝูง ตลอดจนผู้ร่วมงาน และเพื่อนบ้าน หรือแม้แต่งานกิจการ
ทางธนาคารของแอ้วเอง ก็ได้รับการรักใคร่จากผู้บังคับบัญชา
และลูกน้องเป็นอย่างมาก

ทางด้านครอบครัว แอ้วเป็นคนรักบ้าน รักสวย รักงาม
เป็นผู้ดูแลบ้านช่อง สิ่งใดที่สามีชอบ ไม่ต้องเอ่ยปากบอก
แอ้วจะสังเกตรู้เอง และจัดหามาให้ โดยสามีแทบไม่ต้องทำ
อะไรเลย เพราะแอ้วถือว่าสิ่งที่แอ้วทำนั้นเป็นความพอใจของ
แอ้วเอง และมีความสุขใจที่จะทำเช่นนั้น

โดยปกติแล้ว แอ้วมีโรคประจำตัวอยู่อย่างเดียว คือ
โรคภูมิแพ้ มักชอบเป็นหวัด และเจ็บหอบหืดบางเป็นครั้งคราว
แต่ก็ไม่มากมายอะไรนัก ชีวิตเราทั้งสองดำเนินไปด้วยความ
สุข และมีคนนับหน้าถือตาในจังหวัดนครราชสีมา

เรามีบุตรด้วยกันเพียงคนเดียว ซึ่งกำลังศึกษาเล่าเรียน
อยู่ในกรุงเทพฯ ด้วยความรักลูก ห่วงลูก ต้องการอยู่ใกล้ลูก
แถมจึงขอย้ายเข้ามาทำงานที่สำนักงานใหญ่ ในปี พ.ศ.

2519

ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 เป็นคราว
เคราะห์ของแ้วโดยสังเกตเห็นก้อนเนื้อเล็กๆ ขนาดประมาณ
หัวแม่มือที่เต้านมข้างซ้าย เนื่องจากแ้วได้ย้ายมาอยู่ทกรุง-
เทพฯ แล้ว จึงได้นำไปให้คุณหมอสมปอง รักษาสุข ที่โรง
พยาบาลรามาริบัติ ซึ่งเคยเป็นเพื่อนนักเรียนแพทย์ด้วยกัน
กับผม เป็นผู้รักษาให้ ได้ทำการผ่าตัดก้อนเนื้อออก เมื่อ
วันที่ 10 มิถุนายน 2519 เป็นโชคร้ายของแ้วเหลือเกิน
ที่ผลการตรวจชิ้นเนื้อปรากฏว่าก้อนเนื้อที่เต้านมนั้นเป็นมะเร็ง
ชนิดแพร่กระจายสู่ท่อน หลังจากผ่าตัดแล้วจึงได้ทำการรักษา
ด้วยการฉายแสงอีกสี่ครั้งจนตลกอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาแ้วสบาย
ดี เป็นแ้วคนเดิม จึงสามารถไปทำงานได้ โดยมีการตรวจ
สอบติดตามผลอยู่เสมอเป็นระยะ ๆ มิได้ขาด ตามการนัดหมาย
ของแพทย์

เคราะห์ร้ายของแอว์ก็ยังไม่หมด ปรากฏว่าหลังจาก
การใช้เอ็กซ์เรย์รักษาแล้วประมาณ 1 ปี เกิดมีตับโตขึ้น ซึ่ง
เป็นผลตามของโรคมะเร็งที่เต้านมซึ่งตัดออกแล้ว ลุกลามไป
โดยไม่สามารถทำการผ่าตัดได้ หากปล่อยไว้เช่นนั้นจะเป็น
อันตรายแก่แอว์ ดังนั้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2520 แพทย์ผู้
ทำการรักษาจึงตัดสินใจให้ยาทำลายเซลล์มะเร็ง ซึ่งแอว์แพ้ย
ยานั้นเป็นอย่างมาก ยาที่ใช้ระงับการกระจายของเซลล์มะเร็ง
ได้พักหนึ่ง แอว์สามารถไปทำงานได้ด้วยกำลังใจที่เข้มแข็ง
ทั้ง ๆ ที่ตัวเองอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็ง แต่ก่อนเพลียลง
ไปกว่าปกติที่เป็นอยู่

หลังจากนั้นประมาณ 5 เดือน ซึ่งใคร ๆ ทั่วไปก็นึกว่า
แอว์หายแล้ว โรคร้ายอันเดิมก็กลับแสดงอาการขึ้นมาอีก แอว์
ต้องเข้าโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2521 และให้ยา
อีกแต่ลดขนาดลง เนื่องจากมีอาการแพ้มาก อาการเพลียต่าง ๆ
คงมีมากขึ้น ดังนั้นในวันที่ 17 เมษายน 2521 แอว์ต้องกลับ
เข้าโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของแอว์ และ
ในที่สุดแอว์ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อเวลา 17.50 น. ของ
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2521

ด้วยคุณลักษณะ หนึ่งความดี สัมกับความเป็นภรรยา หนึ่ง
 เป็นแม่ที่ดีของลูก ประกอบกับบุญกุศลบารมีที่ได้กระทำไว้
 ทั้งชาติหนึ่งและชาติก่อน ขอให้เราทั้งสองนี้ หากเกิดชาติใด
 แห่งใด ก็ขอให้เราทั้งสองต้องอยู่ร่วมกันอีก ขอให้ดวง
 วิญญาณของแ้วจงไปสู่ในสัมปรายภพหน้าเถิด

ด้วยความรัก และอาลัยอย่างสุดซึ้ง
 นายแพทย์ประดิษฐ์ รัตนพานิช

แต่ “เสมอจิตต์” มิตรในเรือน

ผจงจารสารสลักลายอักษร
เพียรประพันธ์มธุรพจน์เป็นบทกลอน
ด้วยอาวรณ์ถวิลถึงรำพึงคิด
โอ ! อาลัยมิตรในเรือนแม่เพื่อนยาก
นาตาพรากเรียงถ้อยร่อยลับ
นิกภาพพจน์แลเลื่องเพ่งพินิจ
“เสมอจิตต์” นอนนิ่งไม่ตึงกาย
ดูปากแก้มแย้มยิ้มเหมือนนยามหลับ
สตรระงับความอาลัย โอ ! ใจหาย
ชีวิตผ่านพบศพคนตาย
มองรูปกายในตำนานสังขารธรรม
การเกิดแก่เจ็บตายสลายลับ
ย่อมแตกดับตจกันวันยังค่ำ
พิเป็นหมอไม่กำหนดใจจดจำ
ไม่เคยนำมาคิดสัณนิทเล
มาเห็นเมื่อยชีพมลายใจหายหัก
ประหลาดนักนักมานิจจาเอ๋ย

ทุกข์เพราะรักพรากไปหากใครเคย
จกเนลยความนัยให้ใครฟัง

น้ำหมกหลงพรังพรายปลายปากกา
เพียงน้ำตาจากใจรินไหลหลัง
ถากขรสะท้อนเสียงสะท้อนดัง
คงได้ฟังอักษรวาไศกาลย
รำพันความรักเธอเสมอจิตต์
แม่มิ่งมิตรเมยรักทตักษย
โอ ! แม่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ
มาจากไปแรมลับไม่กลับคืน

เหมือนโลกมืดซัดขานิจจาเอ๋ย
กระไรเลยไป ไม่กลับหลับไม่ตื่น
หวนรำลึกความหลังไม่ยงย่น
กลนสะท้อนอดอนรำพันความ

สองเราเคยสุขสมภิรมย์ริน
แสนสดชื่นสมมาดสวาทหวน
เพียงดวงใจนำชมช่างสมนาม
คิดถึงยามอยู่ร่วมเมอครองเรือน

งามถ้อยคำน้ำใจหาใครเปรียบ

มาเทียมเทียบเท่าเธอเสมอเหมือน

รักเคารพญาติสนิทจิตใจเตือน

สมเป็นเพื่อนคู่ขวัญคงคิด

โดยศักดิ์ศรีเธอเป็นพี่สาวใหญ่

อัชฌาสรย่นอบนบไม่ลบหลู่

คุณความดีแสนประเสริฐควรเชิดชู

เธอเป็นผู้ช่วยนำความเจริญ

ส่งเสริมเกียรติยศกลเราเฝ้าจงรัก

เสียตายนงสนคําราสรรเสริญ

จะเปรียบกับสิ่งใดก็ไกลเกิน

สุดประเมินคุณคําราคานาง

เสียตายความสามารถฉลาดเฉลียว

เป็นเครื่องเหนี่ยวโน้มน้ำใจไม่หองหมาง

อุปสรรคสารพันทกนทาง

เธอแผ้วถางช่วยเหลือไม่เบื้อเบื้อน

โอ้! แดนนี้แต่จะแลล็บ

ไม่หวนกลบมาให้เห็นอยู่เป็นเพื่อน

ทุกมุมห้องจะหมองเศร้าทงเหยาเรอน

ใครจะเียนแยมสรวลชวนสนทนา
 ด้วยคำพูดบ้างคมอารมณ์บน
 ช่วยขบขขันให้หรรษา
 เอรกลูกถนอมเลี้ยงเพ่งชว
 อนิจจา ! แสนสงสารพยานรัก

ในอ้อมแขนของพ่อहनอลูกแก้ว
 จงผ่องแผ้วพูนทวีเป็นศรัศกต
 เชิญวิญญาณแม่เจ้าเฝ้าพิทักษ์
 ให้ลูกรักเสมอจิตต์ “ดิษยา”
 ผลักหญิงคนเดียวก่ลยวสวาท
 จงสืบชาติสืบตระกูลอย่าสูญค่า
 แม้ความดีมีแนเหมือนมารดา
 จะพันผ้าอุปสรรคเป็นหลักชัย
 ด้วยความรักต่อเธอเสมอจิตต์
 ขอบอทิศความส่บทุกอย่างให้
 จะเลี้ยงลูกน้อยแก้วกลอยใจ
 แทนความดีที่เธอให้แกฟ เอย

นายแพทย์ประดิษฐ์ รัตนพานิช

เกียรตินิพนธ์

1. The first part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States. It is argued that a knowledge of the past is essential for a full understanding of the present and for the development of a sound policy for the future. The author points out that the study of history is not only a means of acquiring knowledge, but also a means of developing the ability to think critically and to make sound judgments.

2. The second part of the paper discusses the role of the government in the development of the United States. It is argued that the government has played a crucial role in the development of the country, and that it is essential for the government to continue to play this role in the future. The author points out that the government has been responsible for the establishment of the Constitution, the development of the federal system, and the creation of the various departments and agencies of the government.

3. The third part of the paper discusses the role of the individual in the development of the United States. It is argued that the individual has played a crucial role in the development of the country, and that it is essential for the individual to continue to play this role in the future. The author points out that the individual has been responsible for the establishment of the various states, the development of the various industries, and the creation of the various social and economic institutions of the country.

4. The fourth part of the paper discusses the role of the future in the development of the United States. It is argued that the future is a time of great opportunity, and that it is essential for the United States to continue to develop and to grow. The author points out that the future is a time when the United States will be able to realize its full potential, and when it will be able to play a leading role in the world.

W. E. B. DuBois


จากคอลัมน์สตรีและบทบาท ใน....

หนังสือพิมพ์ ภูธร

ฉบับที่ 3 ปีที่ 1

ประจำเดือนสิงหาคม 2518

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประจำจังหวัดนครราชสีมา



เสมอจิตต์ รัตนพานิช

สัทธิหมายเลข 1

จังหวัดนครราชสีมา ปี 18

“การทำงานด้วยความตั้งใจบริสุทธิ์ใจแล้ว
ผลงานออกมาจะมีแต่ความถูกต้อง”

น้อยคนนักที่ไม่รู้จักชื่อ
เสมอจิตต์ รัตนพานิช ยิ่ง
ในวงการค้า หน่วยราชการ
ด้วยแล้วจะรู้จักดี ใน
ตำแหน่งผู้จัดการธนาคารกรุง
ไทย สาขานครราชสีมา

ตลอดเวลา 20 ปี ของ
การต่อสู้ คุณเสมอจิตต์
รัตนพานิช สตรีผู้เลือกแนว
ทางเดินของชีวิตด้วยตนเอง
ใช้ความรู้ ความสามารถ
ในการดำเนินงานด้าน ธุรกิจ

เข้าต่อสู้เพื่อความสำเร็จโดย
ยึดถือคติในการทำงานว่า
“การทำงานด้วยความตั้งใจ
บริสุทธิ์ใจแล้ว ผลงานที่ออก
มาจะมีแต่ความถูกต้อง”

ทำให้สตรีผู้บุกเบิกงาน
ด้านธนาคารชนชั้นกลางควบ
คู่มกิจการธนาคารไม่ด้อยกว่า
ผู้ชายนอกสามศอก

คุณเสมอจิตต์ รตนพานิช
เป็นสตรีคนแรก ที่ได้รับ
ตำแหน่งผู้จัดการธนาคารของ
นครราชสีมา คือสหภาพสตรี
ที่กำลังจะแนะนำให้ท่านรู้จัก

คุณเสมอจิตต์ รตนพานิช
เป็นบุตรของหลวงอักษรสาร-
กิจและคุณลม่อม กำเนิดที่
อำเภอเมืองยะลา เมื่อ 18
กันยายน 2468 สำเร็จเตรียม
อุดม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และได้ศึกษาทางเกษตรศาสตร์
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
สำเร็จหลักสูตรเป็นบัณฑิต
พ.ศ. 2494 เข้าทำงานครั้งแรก
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
และต่อมาได้ทำงานธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด สาขานคร
ราชสีมา (เดิมเป็นธนาคาร
เกษตรจำกัด) ในตำแหน่งผู้
รักษาเงิน และต่อมาได้เป็นผู้
ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการ
ตามลำดับ

คุณเสมอจิตต์ ได้สมรส
กับนายแพทย์ประดิษฐ์ รตน-
พานิช (พ่อพระ) นายแพทย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนคร
ราชสีมา มีบุตร 1 คน คือ
ด.ญ. ดิษยา รตนพานิช

เลียบมือนาง

บทความ

สันเขื่อนเพื่อการเกษตร

ที่ ต. ใหม่ อ. โนนสูง

ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน “สยามรัฐ”

๕๖๗
ตั้งแต่วันที่ 18-26 ตุลาคม 2517



การให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรโครงการ พื้นที่เด่นประจำปี 2517

ณ ตำบลใหม่ อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา



บทนำ

การที่ประเทศเกษตรกรรมจะเจริญก้าวหน้าด้วยวิธีการ
ทางด้านการพัฒนาการเกษตรได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเป็นหลักสำคัญ ถ้า
เกษตรกรมีฐานะยากจนแม้แต่หนี้สินล้นพ้นตัวแล้ว คงจะไม่เกิด
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้วยการเกษตรกรรม การ
ปล่อยสินเชื่อเพื่อการเกษตร เป็นทางหนึ่งของการพัฒนาการ
เกษตรซึ่งเป็นภาระที่สำคัญควรตระหนักถึงว่าจะก่อให้เกิดปัญ-
หาแก่เกษตรกรมากยิ่งขึ้นด้วยการสร้างหนี้ หรือจะช่วยเหลือ
ฐานะของเกษตรกรให้ดีขึ้น ในการนี้ทางสำนักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบทร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด ดำเนินการให้
สินเชื่อเพื่อการเกษตรในโครงการพื้นที่เด่น ณ ตำบลใหม่

อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา ประจำปี 2517 เป็นโครงการ
การแห่งหนึ่งที่ทำพร้อมกันไปในช่วง

สภาพทั่วไปของตำบลใหม่ อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา

สภาพทางภูมิศาสตร์

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ดอนที่ตั้งอยู่บนที่
ราบสูงโคราช พื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับการปราบเรียบเพื่อที่ใช้
ในการเพาะปลูก ในบริเวณที่นามีต้นไม้ใหญ่ยืนต้นแทรก
อยู่ทั่วบริเวณท้องที่

ชนิดของดินประกอบด้วยดินชุด Lowluminic gley
soils and Red Yellow Podzolic soils with laterite, an
old alluvium; level to undulating (Unit 9)^{1/} เป็นดิน
ร่วนและดินร่วนปนทราย มีทั้งการระบายน้ำดี และชนิดมี
การระบายน้ำเลวและระดับความสมบูรณ์ของดินต่ำ ในบาง
บริเวณของพื้นที่ตำบลจะมีดินประเภท Alluvial soils on
recent alluvium: (Unit 2)^{2/} ซึ่งเป็นดินเหนียวจัด มีระดับ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลางถึงค่อนข้างสูง และมีการ
ระบายน้ำเลว กอปรกับเป็นดินที่มีสารมลพิษเป็นด่างน้อย

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 32.2 องศาเซนติเกรด อุณหภูมิ
เฉลี่ยต่ำสุด 21.9 องศาเซนติเกรด อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในเดือน
เมษายน และอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในเดือนมกราคมของทุกปี ฤดู
ฝนของบริเวณตำบลใหม่ เริ่มจากเดือน เมษายน-ตุลาคม
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,111.9 มม. ต่อปี ฝนตกหนักที่สุดใน
เดือนกันยายน เฉลี่ย 248.5 มม. สาเหตุที่ฝนตกน้อยเนื่องมา
จากได้รับอิทธิพลจากสถานที่ตั้งบนที่ราบสูงโคราช^{3/} เพราะ
มีทิวเขาเพชรบูรณ์^{๔/} กั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ตำบลใหม่อยู่ห่างจากบริเวณตัวจังหวัดนครราชสีมาประ
มาณ 26 กม. มีทางหลวงสายมิตรภาพ-(นครราชสีมา-หนอง
คาย) ผ่าน และห่างจากตัวอำเภอโนนสูงประมาณ 5 กม. (ตาม
แนวทางถนนเข้าสู่อำเภอ) ทิศเหนือจดบริเวณเทศบาลตำบล
โนนสูง ทิศใต้จดบริเวณตำบลโตนด ทิศตะวันออกจดบริเวณ
ดอนชมพู ทิศตะวันตกจดอำเภอเมืองนครราชสีมา

พื้นที่ทำการเกษตรของประชากรในบริเวณตำบลใหม่
มีแหล่งน้ำอยู่ในหมู่ที่ 4 เป็นบึงหนองที่ขังน้ำ แต่ในบางปีกน
การน้ำ ๆ ในบึงจะแห้งขอด ซึ่งประชากรส่วนใหญ่สามารถ

จะใช้น้ำจากแหล่ง ดังกล่าว ทำ การ เพาะ ปลูก ะ หว่าง เดือน
กรกฎาคม—ธันวาคม

ประชากร

ประชากรในตำบลใหม่มีทั้งสิ้น 7,423 คน เป็นชาย 3,849 คน และเป็นหญิง 3,574 คน (สำรวจเมื่อ สิงหาคม 2517) ประชากรที่มีฐานะดีมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 7 คน เป็นบุคคลวัยทำงานโดยเฉลี่ย 3 คน (คิดปัดเศษทศนิยม) เป็นเด็กและคนชรา 4 คน ส่วนประชากรที่มีฐานะยากจน มีสมาชิกในครัวเรือน 6 คน เป็นบุคคลวัยทำงาน 3 คน ประชากรในท้องถิ่นนี้ ได้รับการศึกษาโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่มัจบเพียงชั้นประถมปีที่ 4 ประกอบอาชีพการทำนาเป็นอาชีพหลักทำไร่ ไร่ ปอ มันสำปะหลังเป็นอาชีพรอง มีสวนผลไม้ มะพร้าว กล้วย มะม่วง ปลูกไผ่ ได้จำหน่ายมีนุ่นบ้างเล็กน้อย ส่วนการเลี้ยงสัตว์ ไก่ ขา และใช้งานไปพร้อม ๆ กัน

การปกครอง

ตำบลใหม่อยู่ในสังกัดของอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

นายอำเภอโนนสูง ขณะทำการสำรวจ (สิงหาคม 2517)

คือ นายบุรี กิตติน

กำนันตำบลใหม่ คือ นายสวัสดิ์ ไกรกลาง

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

กล่าวโดยทั่วไปแล้วตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ^{๕๖}มีแหล่งรายได้หลักของประชากร^{๕๗}ขึ้นอยู่กับ^{๕๘}การเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่ จากสถิติในปี พ.ศ. 2514 มูลค่า^{๕๙}เพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร ประมาณร้อยละ 30 ทุกครัวเรือน^{๖๐}ในบริเวณ^{๖๑}ทำการกสิกรรม และเมื่อว่างจากการผลิตก็^{๖๒}หางาน^{๖๓}อื่นทำ

ก. การยึดครองที่ดิน สำหรับประชากรมีฐานะดี จะ^{๖๔}ถือครองที่ดินสูงสุดโดยเฉลี่ย 61.52 ไร่ เป็นที่ดินของตน^{๖๕}เองทั้งหมด และทำประโยชน์ในทางการเกษตร 42.12 ไร่^{๖๖}เป็นที่ปลูกสร้างโรงเรือนและที่อยู่อาศัย 3.31 ไร่ นอกนั้น^{๖๗}เป็นที่ว่างเปล่า^{๖๘}ที่มิได้ทำประโยชน์ใด ส่วนประชากรที่ยาก^{๖๙}จน ถือครองที่ดินทั้งหมดโดยเฉลี่ย 10.10 ไร่ ใช้ทำการ^{๗๐}เกษตร 7.53 ไร่ เป็นที่ปลูกสร้างโรงเรือนประมาณ 1.02 ไร่^{๗๑}นอกนั้น^{๗๒}เป็น^{๗๓}ที่ว่างเปล่า

หวตงตำบลมอญ 2 ราย ที่เช่าทำกิน โดยจ่ายค่าเช่า
ในรูปพืชผลอัตราร้อยละ 40

ข. ชนิดของฟาร์ม ส่วนใหญ่ทำฟาร์มปลูกพืช 2
รุ่น หมุนเวียนกันไป คือ ทำนา และทำปอ แต่การทำปอ
มีจำนวนน้อยถัวเฉลี่ยประมาณ 6.23 ไร่ สัตว์เลี้ยงมีเลี้ยงไว้
ใช้งาน และขายเมื่อปลดขราแล้ว

ชนิดของพืชที่ใช้ปลูกนั้น มีข้าวพันธุ์ กข. 1, กข. 2
พันธุ์ เหลืองอ่อนและข้าวดอกมะลิ ทำปอแก้วและมันสำปะหลัง
ด้วย ผลผลิตต่อไร่โดยไม่มีการใช้ปุ๋ยโดยเฉลี่ย ข้าว 20 ถึง
/ ไร่ ปอ 100 กก./ไร่ และมันสำปะหลัง 1,000 กก./ไร่
ซึ่งสินค้าเหล่านี้ นอกจากข้าวมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ โดยที่
บริเวณอำเภอโนนสูง ตอนใกล้ตลาดก็มีลานตากมันของพ่อค้า
คนกลางรับซื้ออยู่ โดยเฉพาะข้าวนี้ส่วนใหญ่ เก็บไว้บริ-
โภคและทำพันธุ์ มากกว่าที่จะขาย

สัตว์เลี้ยงมีโค กระบือ พันธุ์ พันเมือง สุกรพันธุ์
Duroc-jersey เป็ด ไก่

ค. การจำแนกผลผลิต ในรอบปีที่ประชากรปลูก
ข้าว จำนวนทั้งสิ้น 17,021 ไร่ ได้ผลผลิตทั้งหมด

345,781 กก. เก็บไว้ทำพันธุ์ 70,000 กก. ใช้บริ โภคใน
ครัวเรือน 245,281 กก. นอกนั้นเหลือขาย

ส่วนการจำหน่ายผลิตผลเกษตร โดยทั่วไปนั้นประชากร
จำหน่ายให้แก่พ่อค้า ในราคาข้าวเปลือก กก. ละ 2 บาท
มันสำปะหลัง กก. ละ 30 สตางค์ และปอ กก. ละ 2.10
บาท (ประมาณโดยเฉลี่ย)

การลำเลียงขนส่งผลิตผลเกษตรจากแหล่งผลิตไปสู่แหล่ง
ของผู้บริโภค โดยปกติใช้รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ขนาดจุ 10—
12 ตัน ระยะทางจากฟาร์มไปที่สถานรับซื้อประมาณ ๔ กม.
เสียค่าใช้จ่ายอัตราคงตัวเที่ยวละ 200 บาท ซึ่งพ่อค้าจะหัก
เงินจากการเอารถเข้าไปรับบรรทุกผลิตผลในฟาร์ม โดยคิด
ราคาเต็มที ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการขนส่งเกษตรกรต้องรับ
ภาระเองทั้งหมด

ง. รายได้—รายจ่าย ในรอบปีที่ผ่านมาครอบครัว
ประชากรที่มีฐานะดี มีรายได้จากการขายข้าว ปอ มัน
สำปะหลังโดยเฉลี่ยปีละ 6,122.37 บาท และมีรายจ่ายใน
ครัวเรือน 6,015.93 บาท ส่วนประชากรที่ยากจนมีรายได้

จากการขายปีละ 3,069.24 บาท และมีรายจ่ายในครอบครัวโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 3,512.66 บาท

ซึ่งรายได้นอกการเกษตรนั้นมีการรับจ้างทำไร่ ได้ค่าจ้างประมาณ 650 บาทต่อคนต่อปี บางส่วนของประชากรที่ว่างจากการเกษตรจะอพยพเข้ากรุงเทพฯ ฯ ชั่วคราวไปรับจ้างขับรถแท็กซี่ รับจ้างทำไร่ที่ อ. ปากช่อง อ. ปักธงชัย อ. นางรอง รายได้ประมาณแน่นอนไม่ได้ และพอถึงฤดูทำนา ก็กลับมาทำนาต่อตามเดิมเป็นเช่นนี้ทุกปี

ลักษณะหนี้

ในรอบปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2516 เกษตรกรไม่ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งใดเลย ฟังจะเริ่มรู้จักจากสถาบันการเงินทางธนาคารพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2517 นี้เอง โดยทางสำนักงาน เร่งรัดพัฒนาชนบทร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด ดำเนินการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตร ในบริเวณโครงการพื้นที่เด่น ตามแผนงานธุรกิจเศรษฐกิจ และทางธนาคารเพื่อการเกษตรก็ดำเนินการอิสระต่อกัน และโครงการต่างกันด้วย

แผนงานธุรกิจเศรษฐกิจชนบท

แผนงานนเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งทาง รพช. ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ตามแผนงาน ๕๔๖ นมวตถุประสงค์ เพื่อช่วยเกษตรกรในเขตเร่งรัดพัฒนาชนบท ในฝ่าย ๔๔๖ การรุกรานของคอมมิวนิสต์ ทาง รพช. เป็นผู้จัดตั้ง กลุ่มเกษตรกรอำเภอขึ้น โดยมีสิ่งประกอบดังนี้

— ฉางเก็บวัสดุสิ้นเชื่อเพื่อการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง

— เครื่องมือทางด้านการเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ำ แทรคเตอร์

— คณะกรรมการของกลุ่มเกษตรกร และที่ทำงานของของคณะกรรมการ

— ผู้จัดการกลุ่มเกษตรกร และสมาชิก
ธนาคารให้ความร่วมมือโดยการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตร แก่สมาชิกกลุ่ม ๆ ในรูปของการให้สินเชื่อเป็นวัสดุ เพื่อเพิ่มผลผลิตของกลุ่ม ๆ

ความสัมพันธ์ของหน่วยงานในแผนธุรกิจเศรษฐกิจ

รพช. จัดหาวัสดุให้แก่กลุ่มเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกร จำยว้สตุให้แก่สมาชิกที่จะขอกู้ตามใบ
ส่งจำยว้สตุของธนาคาร

สมาชิก เสนอคำขอกู้ตามแบบสำรวจแสดงฐานะเกษตรกร
กร เมื่อได้รับการอนุมัติจากธนาคารให้ทำสัญญา และรับ
ว้สตุตามความต้องการและตามธนาคารอนุมัติ

ธนาคาร ตัดบัญชีของสมาชิกตามใบรับว้สตุ โดยที่
ธนาคารเป็นเจ้าหนี้ และเกษตรกรเป็นลูกหนี้

ธนาคารให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรแก่สมาชิกในระยะสั้น
เพียง 1 ปี การดำเนินการให้สินเชื่อประเภทพืชเพื่อเพิ่มผล
ผลิตขึ้นอยู่กับแต่ละท้องที่ ซึ่งทางกลุ่มจะเสนอให้ รพช.
พิจารณาการส่งเสริม ข้าว ปอ มัน และกำหนดวงเงิน
เท่าที่จำเป็นที่สุดในการเกษตรกรรม ซึ่งทางธนาคารจะกำหนด
ให้สมาชิกกลุ่มย่อยร่วมกันรับสภาพหนี้ร่วมกันในฐานะผู้รวม

ในการสำรวจของธนาคารตามแบบแสดงฐานะเกษตรกร
ธนาคารจะเก็บรายละเอียด และพิจารณาว่าสมาชิก ต้องเป็นผู้
ไม่เคยมีหนี้กับสถาบันการเงินใดมาก่อน และเป็นผู้มีความ
ขยันในการประกอบอาชีพด้วย ในการนี้ทางธนาคารกรุงไทย
จำกัดได้ให้ความร่วมมือกับทาง รพช. ให้สินเชื่อเพื่อการ

เกษตรแก่เกษตรกรในเขตพื้นที่เด่น ตามแผนงานพื้นที่
เด่น รพช. ซึ่งได้เริ่มโครงการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517 เป็น
การนำแผนธุรกิจเศรษฐกิจมาทำในพื้นที่เด่นโดย

1. เขตการปฏิบัติการให้สินเชื่อ รพช. เป็นผู้กำหนด
ให้ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเขต
หนึ่งใน 16 จังหวัด

2. ในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ต. ใหม่ ธนาคาร
กรุงไทย จำกัด สาขานครราชสีมา ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
รพช. ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ รพช. ประจำจังหวัด โดย
ทำการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เมื่อเดือนกรกฎาคม 2517 โดย
มีกลุ่มย่อยซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 5 — 10 คน และแต่ละกลุ่ม
ย่อมมารวมเป็นกลุ่มเกษตรกร โดยที่กลุ่มย่อยจะคัดเลือก
เกษตรกรที่มีภูมิลำเนาในหมู่บ้านเดียวกัน และพื้นที่ปลูก
บริเวณเดียวกัน มีความซื่อสัตย์ต่อกัน นำเสนอแบบแสดง
ฐานะของเกษตรกร ซึ่งพนักงานสินเชื่อเพื่อการเกษตรประจำ
สาขาของธนาคารจะออกไปสำรวจฐานะของเกษตรกร เพื่อ
นำข้อมูล มาประกอบการพิจารณา อนุมัติการให้กู้ของ ผู้จัดการ
สาขา

คุณสมบัติของเกษตรกรผู้ที่จะได้รับสินเชื่อเพื่อการเกษตร

1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
3. เป็นเกษตรกร คือเป็นผู้มีอาชีพหลักในการทำนา
ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ หรือมีกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ
เกษตร
4. มีความชำนาญ หรือได้รับการอบรมทางการเกษตร
มาพอสมควร
5. มีที่อยู่และประกอบกิจการเกษตรส่วนใหญ่ของตนเอง
ในท้องที่ ดำเนินงานสินเชื่อ เพื่อการเกษตร ของธนาคารซึ่งตน
จะขอ
6. เป็นมูลทาง ที่จะก่อให้เกิดผลิตผลการเกษตรเพื่อ
ขายบหน่งๆ เป็นมูลค่าเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้ตามสัญญา
7. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีชื่อเสียงดี ขยัน
ขันแข็งในการประกอบอาชีพ และรู้จักประหยัด
8. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
9. ไม่เป็นคนล้มละลาย หรือเป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
10. ไม่เคยทำผิดระเบียบสินเชื่อ เพื่อการเกษตรของ
ธนาคารอย่างร้ายแรง

คนกลางที่จะช่วยกำไรไปจากเกษตรกร เงินกำไรนี้^๕ได้จากการขายปุ๋ยที่เหลือ จากการขายผลิตผลทางการเกษตร^๖ในรุ่นแรกของการเพาะปลูก

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. น้ำไม่พอเพียงแก่การเพาะปลูก ฝนแล้งไม่ตรงตามฤดูกาล
2. ขาดความรู้ด้านการเพาะปลูกสมัยใหม่
3. ขาดเงินทุนที่จะมาใช้หมุนเวียน ระหว่างการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์
4. อิทธิพลจากพ่อค้าคนกลาง^๗ที่รับซื้อผลิตผล^๘ แต่สามารถขจัดได้เมื่อตั้งกลุ่มเกษตรกร

ผลการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรและข้อเสนอแนะ

เกษตรกรรู้จักการใช้เงินทุนหมุนเวียน^๙ในรูป วัสดุแทนการให้เงินสดซึ่งเกษตรกรอาจนำไปใช้ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ และการติดตามกำกับผล^{๑๐}เป็นระยะโดยแนะนำความรู้^{๑๑}ทางด้านการเกษตร ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของพนักงานสินเชื่อเพื่อการเกษตร (ธนาคารพาณิชย์บางแห่งกำหนดนโยบายเพียง

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเท่านั้น แต่การดำเนินการ
 การยังอยู่ในวงแคบและมีเงินทุนของสินเชื่อจำกัด) ค่าใช้จ่าย
 ในการดำเนินการอาจสูงไปบ้างแต่เมื่อคิดถึงผลที่ได้รับกลุ่มค่า
 ในการที่ยกระดับฐานะของเกษตรกรให้ดีขึ้นกว่าเก่า และมี
 ความคิดว่าทางธนาคารพาณิชย์ไม่ได้ทอดทิ้งเลย ปัจจุบัน
 เกษตรกรส่วนใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรตำบลใหม่ อำเภอโนน
 สูง จังหวัดนครราชสีมาได้รับผลการให้สินเชื่อโดยการกำกับ
 แนะนำมีผลกำไร ก็น่าที่รัฐจะขยายงานให้กว้างทั่วประเทศ
 โดยโครงการเช่นนี้อาจจริงดังต่อไปนี้

เสมอจิตต์ รัตนพานิช

เรวัตร์ ชาตวรวิชัย

មាណីសីវិត



ความเป็นพิษของยารักษาโรค

ชมรมเผยแพร่ความรู้เรื่องยา
สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล

เมื่อเกิดความเจ็บป่วยขึ้น สิ่งที่ต้องการเป็นอันดับ
แรกคือ หายยามากินเพื่อจะได้หายจากโรค ซึ่งบางทีไม่ได้
เฉลียวใจเลยว่า ยาทุกชนิดมีพิษแอบแฝงอยู่ การใช้ยาโดย
ไม่มีความรู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ นอกจากจะทำให้โรคเก่าไม่
หายแล้ว ยังอาจเกิดโรคใหม่ที่หาสาเหตุไม่เจออีกด้วย ดัง
นั้น ก่อนจะใช้ยาเราจึงควรรู้ถึงอันตรายของมัน

อันตรายจากการใช้ยารักษาโรค อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้

1. การใช้ยาเกินขนาด ก่อนอื่นเราควรรู้ว่า

การที่ยาจะสามารถรักษาโรคได้นั้น จะต้องมึปริมาณของยาในเลือดหรือในเนื้อเยื่อสูงเพียงพอถึงระดับหนึ่ง จึงจะสามารถรักษาโรคได้ ถ้าระดับยาต่ำไปการรักษา ก็ไม่ได้ ถ้าระดับยาสูงเกินไป ก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกายจนอาจถึงตายได้

ยาทกินทีละเม็ด ถ้ากินพร้อมกันทีเดียว 3 เม็ด ผลการรักษายังคงเดิม แต่อันตรายเพิ่มขึ้น 3 เท่า

การใช้ยาเกินขนาดเกิดอันตรายมาก เป็นต้นว่า ยาล้าง ถ้ากินมากเกินไปก็กลายเป็นท้องร่วง คนเป็นโรคความดันโลหิตสูง ถ้ากินยาลดความดันมาก ๆ จะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ สมองขาดออกซิเจน หน้ามืด เกิดสมองพิการได้ ยานอนหลับ ถ้ากินมากเกินไป ก็อาจหลับโดยไม่มีวันตื่นได้

ข้อแนะนำในการกินยา ไม่ควรจจะร้อนใจอยากให้หายเร็ว ๆ ควรกินตามที่แพทย์กำหนดยาที่กินไปหายช้า อาจจะกินไปตายไปได้เช่นกัน กรุงโรม ไม่ได้สร้างเสร็จภายใน 3 วันนั้นใด ร่างกายที่เจ็บ

บ๊วยก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ภายใน 3 ชม. นั้น
 นั้น

2 ผลข้างเคียง (Side effect) ยาแทบทุกชนิด นอกจากจะมีผลในทางรักษาแล้ว ยังอาจทำให้เกิดผลอย่างอื่นแทรกอยู่ด้วย ผลข้างเคียงที่แทรกอยู่นั้นบางชนิดอาจไม่ร้ายแรงเท่าไร แต่บางชนิดมีอันตรายร้ายแรงที่น่ากลัวมาก เป็นต้นว่า พวดยาแก้ไอ ขับเสมหะ หรือยานอนหลับ เมื่อใช้แล้วอาจทำให้เกิดการเสพติดได้ ยาที่แก้แพ้ท้องในหญิงมีครรภ์ ได้แก่ ธาลิโดไมด์ (Thalidomide) มีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงมากคือทำให้ทารกในครรภ์พิการ และตายได้ ยาสเตรปโตมัยซิน ใช้รักษาวัณโรคแต่มีพิษทำให้หูหนวก เสียการทรงตัวได้ การชอยากินเองจึงควรระวังถึงผลข้างเคียงของยาด้วย โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์ ไม่ควรใช้ยาโดยไม่จำเป็น ถ้าจะใช้ต้องอยู่ภายใต้การแนะนำและควบคุมของแพทย์อย่างใกล้ชิด

3. การแพ้ยา (Drug allergy) การแพ้ยาเป็นอาการที่แสดงออกหลังจากร่างกายได้รับยาเข้าไป เนื่องจากร่างกายเคยได้รับยาประเภทเดียวกันมาก่อน การที่

เกิดแพ้ เพราะเมื่อร่างกายได้รับยาครั้งแรก อาจเป็นโดยการกิน การทา เมื่อยาเข้าไปในร่างกายแล้ว ร่างกายก็ค่อยๆ สร้างภูมิต้านทานขึ้นต่อต้านยานั้น ๆ ซึ่งกินเวลานานพอสมควร เมื่อร่างกายสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อยานั้นแล้ว ถ้าได้รับยาชนิดนั้นเข้าไปอีก ภูมิต้านทานนั้นจะเข้าไปรวมกับยา เกิดสารประกอบเชิงซ้อน (Complex) ทำให้เกิดอาการแพ้ อาการแพ้ อาจค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป หรือเกิดในทันทีอาจมีเพียงขึ้นผื่นตามผิวหนังแบบลมพิษ หรือ อาจรุนแรงถึงตายได้

4. การดื้อยา (Drug resistance) การดื้อยา หมายถึงการที่เชื้อซึ่งแต่เดิมถูกทำลาย โดยยาชนิดหนึ่งแต่สามารถปรับตัวจนไม่ถูกทำลายโดยยานั้นอีก การปรับตัวนี้อาจเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะคุณสมบัติ (Mutation) หรือสร้างขึ้นมาทำลาย เมื่อเชื้อโรคชนิดหนึ่งดื้อยา มันสามารถถ่ายทอดการดื้อยาไปให้เชืชนิดอื่น และลูกหลานของมันได้ หรือบางทีเมื่อดื้อยาตัวหนึ่งแล้ว ทำให้สามารถดื้อยาตัวอื่นได้อีกหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาพวกปฏิชีวนะ ถ้าใช้พร่ำเพรื่ออย่างไม่ถูกต้อง เช่นใช้ ๆ หยุด ๆ กินไม่สม่ำเสมอจะ

ทำให้เช็ดดยา ทำให้ยากแก่การรักษา เป็นผลร้ายต่อตัว
 เองและ ต่อสังคม ต่อตัวเอง เช่น เมื่อเช็ดเกิดดยาแล้ว
 การให้ยาก็ไม่ได้ผล ต้องเพิ่มขนาดยาขึ้นเรื่อย ๆ จนพิษของ
 ยาทำอันตรายแก่ร่างกายได้ ผลต่อสังคมเช่น คนเป็นกามโรค
 มักกลัว อาย ไม่กล้าไปหาหมอจึงไปหาซื้อยามากินเอง ทำ
 ให้เช็ดดยานั้นไปยังคนอื่นอีกด้วย ทำให้ปัญหาสังคมกว้าง
 มากขึ้น

5. การใช้ยาในทางที่ผิด เช่นมอร์ฟีนซึ่งใช้เป็น
 ยาแก้ปวด แต่เอามาฉีดเพื่อให้เกิดอารมณ์เคลิบเคลิ้ม ยา
 กระตุ้นประสาท (Amphetamine) ก็นำมาเป็นยาแก้หวัด ส่วน
 มากใช้ในพวกนักศึกษาที่ดูหนังสือก่อนสอบ พวกขับรถกลาง
 คืนและพวกโสเภณี ยาเหล่านี้ เมื่อนำมาใช้ในทางที่ผิดก็
 ให้โทษแก่ร่างกายคือ ทำให้เกิดเสพติด มีอันตรายต่อ
 จิตใจและร่างกายอย่างมาก ร่างกายเสื่อมโทรมจิตใจก็อ่อน
 แอ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้

6. ปฏิกริยาของยาหลายชนิดในร่างกาย เมื่อ
 ยามากกว่า 2 ชนิดเข้าไปในร่างกายพร้อม ๆ กัน ยาเหล่านั้น
 อาจจะเสริมฤทธิ์กันเอง ทำให้มีผลมากขึ้น หรือว่าฤทธิ์ของ

ยารุนแรงขึ้นกว่าปกติหรือบางทีอาจ ฆ่าฤทธิ์กันเองทำให้
ไม่มีผลต่อการรักษาเพียงพอ เช่นในเด็กอ่อนมีสารบิลิรูบิน
(Bilirubin) มาก แต่ไม่มีอันตราย เพราะรวมตัวกับโปรตีน
เมื่อให้กินยาพวกลดฟลาหรือวิตามินเคเข้าไป มันจะไปไล่ที่
บิลิรูบินออกจากโปรตีน แล้วเข้าไปในเนื้อเยื่อและสมอง ทำ
ให้เด็กมีความผิดปกติคือ มีอาการตัวเหลือง และปัญญา
อ่อน

7. การตอบสนองต่อยาในคนที่มีความผิดปกติ
ทางพันธุกรรม คนบางคนมีข้อบกพร่องทางกรรมพันธุ์ โดย
ที่ตัวเองไม่รู้ เพราะว่า ไม่มีอาการผิดปกติแสดงออกมาให้
เห็นแต่เมื่อกินยาบางชนิดเข้าไป อาการผิดปกตินั้นจะแสดง
ออกทันที ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ เช่นบางคนในเม็ดเลือดมี
แอนไซม์ G6PD (enz. glucose-6-phosphate dehydrogenase)
ผิดปกติ เมื่อได้กินยาซัลฟา หรือยาแก้ไข้ในขนาดธรรมดาๆ
จะทำให้เม็ดเลือดแดงแตก เกิดโรคโลหิตจาง หรือ บัสสาวะ
ออกมาเป็นเลือดได้

ข้อควรระวัง

การใช้ยาทุกชนิด ควรจะต้องคำนึงอยู่เสมอว่า ยามี

ทั้งคุณและโทษพอ ๆ กัน ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปใช้ และเมื่อจำเป็นต้องใช้ ก็ให้ชั่งน้ำหนักความรู้นะหน้า ไม่ควรไปซื้อหามากินเองโดยไม่รู้เรื่อง

ยาปฏิชีวนะ

ยาปฏิชีวนะ เป็นสารที่สกัดจากแบคทีเรียและราบางชนิด ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้หลายชนิดเป็นยาที่ใช้ได้ผลดีมากในปัจจุบัน แต่ก็มีโทษมากพอก ๆ กับประโยชน์ของมัน เนื่องจากภาวะการณของตลาดยาเมืองไทย ทำให้มีการขายยาปฏิชีวนะกันอย่างแพร่หลาย การซื้อได้ง่าย ราคาพอสมควร ประชาชนจึงนิยมซื้อมาใช้กันเองมาก เพราะรักษาโรคได้ ผลชะงัด โดยไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาไปโรงพยาบาล แต่การซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองนั้น มีอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อมมากมายซึ่งผู้ใช้อย่ามองไม่เห็น ผู้ใช้ยาจึงควรจะมีความรู้ ใ้บ้าง เพื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดความปลอดภัยทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น

ยาปฏิชีวนะแทบทุกชนิดมีพิษร้ายแรง และเมื่อใช้ไปนาน ๆ อาจทำให้เกิดการแพ้ยาขึ้นได้ แพทย์เอง ก่อนที่จะ

จ่ายยาปฏิชีวนะ ก็จำเป็นต้องวินิจฉัยโรคอย่างละเอียดทางห้อง
 วิจัย (Laboratory) ว่าโรคนั้น ๆ เกิดจากเชื้ออะไรแน่ เพื่อจะ
 สามารถเลือกใช้ยาได้ถูกต้อง โรคบางชนิดเกิดจากเชื้อหลาย
 ตัว โดยเชื้อแต่ละตัวมีความต้านทานต่อยาไม่เท่ากัน แพทย์ก็
 ต้องเลือกจ่ายยาที่มีประสิทธิภาพที่สุด มีอันตรายต่อผู้ป่วยน้อย
 ที่สุด สมมติเราป่วยเป็นโรคอย่างหนึ่ง เราไม่มีทางรู้แน่ว่าโรค
 นั้นเกิดจากเชื้ออะไร การที่ไปซื้อยามากินเอง จึงเป็นการรักษา
 อย่างเดาสุ่ม ซึ่งนอกจากจะไม่ช่วยรักษาโรคแล้วยังอาจทำให้
 เกิดโทษขึ้นอีกด้วย ฉะนั้นหนทางที่ดีที่สุด ถ้าเป็นยาปฏิชีวนะ
 แล้ว ไม่ว่าประเภทไหนไม่จำเป็นอย่าไปซื้อมาใช้เอง โดยเฉพาะ
 เด็กเล็กที่อายุยังไม่ถึง ๘ ขวบ ไม่ควรซื้อยามาใช้เอง
 เลย ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ควรให้ผู้มีความรู้เรื่องยาแนะนำเสีย
 ก่อน

ยาปฏิชีวนะที่ขายกันตามท้องตลาดมีมากมายหลายร้อย
 ชื่อ ความจริงมีอยู่ไม่กี่ชนิดเลย ได้แก่

— เพนิซิลลิน และเซฟฟาโลสปอริน (Penicillin.
 Cephalosporin)

— คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol)

— เตตราไซคลิน เช่น ออริโอมัยซิน (Tetracycline eg. Aureomycin)

— อมิโนไกลโคไซด์ เช่น สเตรปโตมัยซิน กานา-
มัยซิน นีโอมัยซิน (Aminoglycoside eg. Streptomycin,
Kanamycin, Neomycin)

— มาโครไลด์ เช่น อิริโทรมัยซิน (Macrolide eg. Erythromycin)

ข้อควรปฏิบัติ

1. กินยาให้ครบจำนวนเพื่อบอกป้องกันการดื้อยา ของเชื้อโรค
2. การไม่สบายเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นเป็นหวัด ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ
3. ยาปฏิชีวนะอาจทำให้เกิดการแพ้ยาได้
4. ยาปฏิชีวนะมีโทษ การใช้ต้องระวังควรขอคำแนะนำจากแพทย์ หรือ เภสัชกรก่อน ยาที่ผ่านรกได้ และห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์หรือระหว่างให้นมทารก คือ
 1. คลอแรมเฟนิคอล
 2. เชฟฟาโลธิน

3. ซัลฟา
4. เตตราไซคลิน
5. สเตอโรอิดมัยซิน

เพนิซิลลิน (Penicillins)

การใช้ การใช้ยาอะไรก็แล้วแต่ว่าเกิดจากเชื้ออะไร และเชื่อนั้นไวต่อยาชนิดไหนเพนิซิลลินใช้รักษา การติดเชื้อที่ไวต่อยานี้ เช่น แผลที่ติดเชื้อ ถูกน้ำร้อนลวก ถูกไฟวลว ไม่ควรใช้ยาผงหรือขผงเพนิซิลลิน แต่ควรใช้ยากินจะดีกว่า เพราะยาปฏิชีวนะที่ใช้ภายนอก อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ในภายหลังได้ง่าย

พิษของยา อันตรายที่หนักกลัวของเพนิซิลลิน คืออาการแพ้ ซึ่งอาจรุนแรงถึงตายได้ การใช้ยาผง หรือขผงเพนิซิลลินทาแผลบ่อย ๆ แล้ว ภายหลังมากินยาหรือฉีดยา จะเกิดอาการแพ้ ซึ่งอาจมีเพียงบนผื่น ลมพิษ หน้ามืด จนถึงช็อคตายคาเข็มได้ จึงควรระวังให้ดี

อาการเป็นพิษ เพนิซิลลินทุกชนิด ระคายเคืองประสาทส่วนกลาง ถ้ากินในขนาดสูง ๆ จะเกิดอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร ทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง การ

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อจะปวดมาก จึงนิยมใช้ฉีดเข้าเส้นซึ่งพิษยาจะทำให้เกิดเลือดจับเป็นก้อนอุดเส้นเลือดดำ คนที่แพ้ยาน ต้องระวังไม่ควรใช้อีก

คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol)

การใช้ คลอแรมเฟนิคอลใช้รักษาอาการอักเสบเนื่องจากการติดเชื้อส่วนใหญ่ได้ แต่การใช้ในระยะหลัง ๆ มักไม่ค่อยได้ผล เพราะเชื้อส่วนใหญ่ดื้อยาเมื่อใช้ไปนาน ๆ ที่ใช้ได้ผลดีจริง ๆ คือ ใช้รักษาไข้ไทฟอยด์ที่เกิดจากเชื้อ *Salmonella* พิชของยา

1. รบกวนระบบทางเดินอาหาร การกินยาเกินขนาดทำให้เกิดการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ภายใน 2-5 วัน ส่วนมากเกิดกับผู้ใหญ่
2. รบกวนไขกระดูก ไขกระดูกมีหน้าที่สร้างเม็ดเลือดจะไปทำให้การสร้างเม็ดเลือดน้อยลง เกิดโรคโลหิตจางถ้าหยุดยาทัน อาการจะดีขึ้น แต่ถ้ายังคงใช้ไปโดยไม่รู้จักเกิดโรคโลหิตจางที่ไม่มีการสร้างเม็ดเลือด (Aplastic anemia) แล้ว แม้จะหยุดยาก็ไม่หาย และจะตายได้ นอกจากนั้นยังทำให้เกิดมะเร็งในเม็ดโลหิตขาว (Leukemia) อีกด้วย

3. อาการเป็นพิษกับเด็ก เด็กเล็กยังไม่มีกลไกที่จะทำลายฤทธิ์ยาได้ เนื่องจากอวัยวะยังไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ยาที่กินจะไปสะสมอยู่ทำให้เกิด Gray Syndrome มีอาการ คือ อาเจียน ตัวเย็นแข็ง ตัวเขียว หดสติ ตายได้ การใช้ยานกับเด็ก ต้องระวังขนาดยาไม่ให้เกิน 50 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ใน 1 วัน (50 mg/kg/day) เด็กเล็กอายุไม่ถึง 8 ขวบ ไม่ควรใช้อย่างเด็ดขาด

หมายเหตุ โทษของคลอแรมตามทีกล่าวมานี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่ถ้าใช้ยาบ่อย ๆ และใช้เป็นประจำไปนาน ๆ จึงจะเกิดโทษ ซึ่งไม่ควรจะวางใจนัก

ข้อควรระวัง ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี

ควรใช้เฉพาะในกรณีรักไทฟอยด์ (ใช้รากษาดน้อย)

เตตราไซคลิน (Tetracycline)

การใช้ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย (bacteria) ถ้าขนาดสูง จะฆ่าเชื้อได้ใช้ได้กับโรคหลายชนิด และใช้ได้กับเชื้อที่ต้านยาพวกเพนิซิลลิน หรือเพียเพนิซิลลิน เตตราไซคลิน มีหลายชนิด มีผลเท่า ๆ กัน แต่เชื่อว่าจะมีความไวต่อยาไม่เท่ากัน ฉะนั้น มีความแตกต่างกันใช้ในการเลือกยาให้เหมาะสม

พิษและอาการเป็นพิษของยา

1. อาการแพ้ยา เกิดขึ้นคล้ายหัด ลมพิษ บางราย
เกิดอาการ อักเสบของ ผนังช่องคลอด อักเสบอาการพวกนี้ มักจะ
เกิดติดต่อกันเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนหลังจากหยุดยา

2. อาการทางเดินอาหาร ทำให้เกิดอาการระคาย
เคืองในกระเพาะลำไส้ เมื่อรับประทานจะมีอาการคลื่นไส้
อาเจียน

แนะนำ ให้กินเตตราไซคลินพร้อมกับอาหาร แต่
ห้ามทานกับนมหรือผลิตภัณฑ์ทางนม และห้ามกินพร้อมกับ
ยาลดกรดในกระเพาะ เนื่องจากจะเกิดเป็นสารประกอบเชิง
ซ้อนทำให้ลดการดูดซึมของยา

ในบางรายอาจเกิดอาการท้องเดิน เนื่องจากอาการ
ระคายทางเดินอาหาร

3. อาการในเส้นเลือด ถ้าให้เตตราไซคลินทางเส้น
เลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉีดซ้ำ ๆ ที่เดิม มักจะเกิดอาการ
เส้นเลือดถูกอุดตันด้วยเลือดที่แข็งเป็นก้อน ถ้าใช้ยานาน ๆ
จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเลือด

4. อาการแพ้แสง จะเกิดอาการผิวหนังไหม้เมื่อถูกแสงแดดโดยตรง

5. อาการเป็นพิษกับตับ ถ้าให้ยาขนาดสูง ๆ ของเตตราไซคลิน จะทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ มักจะเกิดกับคนไข้ที่รับยา 2 กรัมหรือมากกว่าต่อวันทางฉีด และอาจเกิดกับคนที่กินยา อาการจะเริ่มด้วยดีซ่าน ต่อมาเกิดโลหิตเป็นพิษ เนื่องจากมีไนโตรเจนหรือยูเรียอยู่ในโลหิต, สภาพเป็นกรดของร่างกาย, ช็อค

6. อาการเป็นพิษกับไต ขนกับชนิดของเตตราขนาดของยา ช่วงระยะเวลาการรักษาและโรคทางไตของผู้กินยา อาการคือ โลหิตเป็นพิษเนื่องจากมีไนโตรเจนหรือยูเรียอยู่ในโลหิต โลหิตมีฟอสเฟตมากเกินไป สภาพเป็นกรดของร่างกาย น้ำหนักลด คลื่นไส้ อาเจียน

7. เลือดแข็งตัวช้า ยานจะทำให้สารที่ทำให้เลือดแข็งตัว (coagulation) มีความสามารถของตัวมันลดลง

8. อาการที่เกี่ยวกับฟันและกระดูก เตตราไซคลินจะจับกับแคลเซียมในฟันและกระดูก ถ้าให้ในเด็กที่มีอายุ 2 เดือนถึง 2 ปี จะทำให้เกิดจุดสีน้ำตาลอย่างถาวรที่ฟัน เนื่อง

จากเตตราไซคลินสามารถผ่านรก และน้ำนมมารดาสู่ทารกได้
 ฉะนั้นจึงต้องระวังในคนท้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ท้อง
 4-6 เดือน และในขณะให้นมทารกในช่วงที่มีการเจริญ
 ของฟันน้ำนม และระยะอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี ซึ่งกำลังมี
 การเจริญของฟันแท้

เตตราไซคลิน สามารถสะสมที่กระดูกของทารกใน
 ครรภ์และเด็กอ่อนได้ ซึ่งจะไปก่อกำการเจริญของกระดูกถึง
 40% ถ้าหากระยะเวลาที่ได้รับยาเตตราไซคลินสั้นอาการเหล่านี้
 นกสามารถจะแก้ไขกลับสู่สภาพปกติได้

9. แฟนโคนิ ซินโดรม (Fanconi syndrome)
 เกิดขึ้นเนื่องจากคนไข้กินยาเตตราไซคลินที่หมดอายุ หรือ
 เสื่อมคุณภาพ จะพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน บัสสาวะมาก
 เกินไป ตื่นน้ำมาก บัสสาวะมีโปรตีน น้ำตาลในบัสสาวะสูง
 ผิดปกติ อาการเหล่านี้จะหายได้ภายใน 1 เดือน หลังจาก
 หยุดใช้ยาเตตราไซคลิน

ข้อควรระวัง

1. ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ หรือให้นมลูก
2. ห้ามใช้ในทารกและเด็กเล็ก
3. ห้ามใช้ในคนที่เป็โรคเกี่ยวกับตับและไต

อีริโทรมัยซิน (Erythromycin)

การใช้ ใช้ได้ดีในโรคคอติบ และใช้แทนเพนิซิลลินในกรณีทคนไข้แพ้ยาหรือเช็ดคอต่อยาเพนิซิลลิน เมื่อใช้ไปนาน ๆ เช็ดอาจคอได้

พิษและอาการเป็นพิษของยา

1. ต่อระบบทางเดินอาหาร ทำให้รู้สึกคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องร่วง

2. คอตีบ อาจทำให้เกิดคอตีบอักเสบ ดีซ่าน และ คอตีบพิการได้ เมื่อใช้ยาวนาน ๆ จึงควรมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเป็นครั้งคราว

ข้อควรระวัง คนเป็นโรคเกี่ยวกับคอตีบไม่ควรใช้ยานี้ ถ้าเกิดอาการแพ้ต้องหยุดยาทันที

สเตรปโตมัยซิน (Streptomycin)

การใช้ ในปัจจุบันใช้รักษาน้อยมากเนื่องจากมียาปฏิชีวนะใหม่ ๆ ที่ได้ผลกว่าและดีกว่า อย่างไรก็ตามสเตรปโตมัยซินยังคงใช้ในการรักษาวณโรคได้อย่างกว้างขวางโดยใช้ร่วมกับยารักษาวณโรคตัวอื่น ๆ

พิษและอาการเป็นพิษของยา

1. อาการแพ้ยา ผิวหนังมีผื่นขึ้น ผิวหนังอักเสบ มีไข้ กระเพาะอักเสบ ข้อ

2. อาการระคายเคือง ต่อระบบทางเดินอาหาร ถ้ากินยา อาจมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเดิน

พิษของยาจะเพิ่มมากขึ้นถ้าคนไข้มีอาการแพ้ยา หลังจากฉีดยา จะเกิดอาการหน้ามืด วิงเวียน เป็นลมปวดหัว รอบ ๆ ตัวรู้สึกตึง ตึงนั้นจึงควรพักสักระยะเวลาหนึ่งหลังจากได้ฉีดยาแล้ว

3. อาการเป็นพิษต่อหู เป็นอาการที่สำคัญมาก ทำให้ประสาทหูเสื่อม และประสาทตาทำงานผิดปกติ เพื่อป้องกันหรือลดการเกิดอาการพิษต่อหูและตา จะต้องระวังในการให้ยา ขนาดและระยะเวลาที่รักษาด้วยยานี้ คนไข้โดยทั่วไปจะไปจะใช้เวลา 1 กรัมต่อวันได้ถึง 1 เดือน โดยไม่มีอาการเกิดขึ้น แต่ในคนไข้ที่ใช้ยา 1-3 กรัมต่อวัน จะเกิดอาการทางหูชั้นภายใน 3-4 สัปดาห์ ถ้าไม่หยุดยา หูอาจหนวกได้ และตาพร่ามองเห็นไม่ชัดเจน

ซัลฟา (Sulfanilamide)

การใช้ ยานมประสิทธิภาพมากในการรักษาโรคบิดไม่มีตัว และยังใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ได้ เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งถึงขนาดแล้วแต่คุณสมบัติของซัลฟาแต่ละตัว

พิษ ทำให้ตกผลึกในกรวยไตทำให้ไตเสียได้

อาการที่เป็นพิษ

1. **อาการแพ้ยา** อาการเริ่มแรกคือ หนาวสั่น เป็นไข้ อาเจียน ตีข่าน ปวดหัว เพลีย ผิวหนังอักเสบอย่างเฉียบพลัน เป็นไข้ ตีข่าน เกิดเป็นจ้ำๆ ที่ผิวหนัง เม็ดโลหิตแตก

2. **อาการผิดปกติในการสร้างเม็ดเลือด** ถ้าเกิดขึ้นจะต้องหยุดยาและให้การรักษาทันที ดังนั้น ควรจะตรวจเลือดด้วยเมื่อกำหนดด้วยยาซัลฟา เป็นเวลาต่อเนื่องกันนาน.

3. **ไม่ควรใช้ยาซัลฟาโรยแผลหรือผิวหนัง** เพราะได้ผลไม่ดี และจะเกิดอาการแพ้ได้ง่าย ซัลฟาบางชนิดใช้ทาผิวหนังที่ไหม้ และอักเสบ จะทำให้เกิดการติดเชื้อราพร้อมทั้งทำให้เช็ดดยาด้วย

ข้อแนะนำ ควรดื่มน้ำมากๆ เมื่อใช้ยานในการรักษา ทั้งนี้ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด การตก ผลึกในไต และกระเพาะปัสสาวะได้

ยาลดไข้ แก้ปวด (Analgesic & Antipyreic)

ในบรรดาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ชาวบ้านเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ โรคที่เป็นกันมากคือ เป็นไข้หรือมีอาการตามบริเวณต่าง ๆ เช่น ปวดหัว ปวดฟัน ปวดกล้ามเนื้อ เป็นต้น ยาที่ใช้รักษาก็อยู่มากมาย มีชื่อต่าง ๆ กันตามบริษัทที่ผลิตออกมาขาย แต่กล่าวโดยสรุปแล้วจะมียาลดไข้ แก้ปวดอยู่เพียง 3 จำพวก

จำพวกแรก ซาลิไซเลต (Salicylate)

การใช้ ตัวอย่างเช่น แอสไพริน เอพิจี (APC) ทัมโซล บวดหาย ประสบบอแรด เป็นต้น ใช้ลดอาการอักเสบพิษ เนื่องจากยาประเภทนี้มีฤทธิ์เป็นกรด ดึงน้ำในเซลล์ให้ไม่ระมัดระวัง ไม่รู้วิธีใช้ที่ถูกต้องหรือใช้มากหรือนานเกินไป ผลข้างเคียงที่อาจเกิดบนมดงน.—

1. ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและลำไส้ อาจเกิดเป็นแผลขึ้นได้ ถ้าใช้ยาไปนาน ๆ กระเพาะอาหารอาจทะลุและตายได้

2. เป็นพิษต่อระบบเลือด ทำให้เม็ดเลือดลดจำนวนลง
3. ถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ ทำให้ใจสั่น มีเสียงในหู
4. ในเด็กที่ใช้ยามากเกินไป แทนที่ยาจะลดไข้กลับจะทำให้มีไข้สูง เพราะเสียน้ำ และอาเจียนทำให้เด็กตายได้

ข้อแนะนำ

1. ไม่กินยาพวกันขณะท้องว่าง ควรกินก่อนหรือหลังอาหารทันที ถ้าจำเป็นต้องกินขณะท้องว่าง ต้องดื่มน้ำตามไปมาก ๆ (1 แก้วเต็ม) หรือกินพร้อมนมก็ได้
2. ไม่กินยาพร้อมกับเหล้า เพราะเหล้าจะไปเสริมฤทธิ์ยาทำให้ระคายเคืองต่อกระเพาะและลำไส้มากขึ้น

ข้อห้ามใช้

1. ห้ามใช้ในคนที่ เป็นโรคกระเพาะอาหาร โรคทางระบบเลือด คนที่แพ้ยาน หรือ คนที่เป็นไข้เลือดออก ถ้าจะใช้ ควรปรึกษาแพทย์
2. ห้ามใช้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 7 เดือน สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 3 ปี ให้ปรึกษาแพทย์ก่อน

จำพวกที่สอง อะเซทอามิโนเฟน (Acetaminophen)

การใช้ ตัวอย่างเช่น Tempra, Tylenol, Panadol เป็นต้น ใช้ลดไข้ ลดปวดที่ไม่รุนแรง เช่น ปวดหัว ปวดฟัน ปวดประจำเดือน ปวดกล้ามเนื้อ ยาจำพวกนี้ไม่สามารถลดอาการปวดที่รุนแรงได้ เช่น ปวดลำไส้

พิษ

1. เป็นพิษต่อดับ ทำให้เกิดดีซ่าน (Jaundice)
2. ถ้าใช้ยาเกินขนาด จะทำให้ปากเปื่อย ปากแตก ข้อย้ำน้ำ ใช้ห้ามใช้ในคนที่ เป็นโรคโลหิตจาง โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต โรคตับ

จำพวกที่สาม ฟีนิลบูตาโซน (Phenyldutazone)

การใช้ ตัวอย่างเช่น บุตาเฟรด บุตาโซลิติน บุตาโลน (ยาเม็ดสามเหลี่ยม) ไม่นิยมใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวด เพราะมีอันตรายมาก จึงใช้ในคนที่ เป็นโรคไขข้ออักเสบ การใช้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์

พิษ

1. ระคายเคืองต่อกระเพาะเหมือนพวกแรก ทำให้กระเพาะเป็นแผลทะลุได้

2. เกิดการสะสมของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย เมื่อ
กดผิวหนังจะเห็นเป็นรอยบุ๋มชัดเจนเนื่องจากร่างกายบวมน้ำ

3. ความต้านทานของร่างกายต่อเชื้อโรคลดลง ทำให้
ติดเชื้อได้ง่ายและแพร่หลายขึ้น

4. อาจเกิดโรคจิต หรือโรคประสาท

ข้อแนะนำ การใช้ยาประเภทนั้ต้องอยู่ในการควบคุม
ของแพทย์ ระหว่างที่ใช้ยานั้ต้องตรวจเลือด บัสสาวะและ
ความดันโลหิต และไม่ควรใช้ยานั้เกิน 1 สัปดาห์

ข้อห้ามใช้ ในคนที่เป็นโรคหัวใจ โรคจิต โรคประ-
สาท โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน

ยาแก้หวัด

หวัดเป็นโรคที่พบได้บ่อย มีสาเหตุที่ทำให้คนเป็นอยู่
2 ประการคือ

1. หวัดเกิดจากเชื้อไวรัส ปัจจุบันยังไม่มียาที่จะรักษา
โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส จึงทำได้แต่เพียงป้องกันไม่ให้มีโรค
แทรกเท่านั้น โดยพักผ่อนมากๆ การดื่มน้ำมากๆ จะช่วยลด
อาการไข้อยู่ได้

2. อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่เป็นหวัด คือ หวัดที่เกิดจากอาการแพ้ต่าง ๆ เช่น แพ้ฝุ่นละออง แพ้อากาศ แพ้เกสรดอกไม้ เป็นต้น ยาแก้หวัดที่ใช้กันจึงประกอบด้วย ตัวยาที่ใช้แก้แพ้ ลดไข้ แก้ปวดและลดอาการคัดจมูก

เมื่อทานยาแก้หวัดจะมีอาการง่วงนอนและมึนงง ดังนั้น ผู้ที่ใช้ยานี้ไม่ควรขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ เพราะ อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

ข้อแนะนำ

1. อาจดื่มน้ำชา หรือกาแฟ หรือลดอาการง่วงนอน
2. หวัดธรรมดาไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ นอกจากว่า จะเจ็บคอ ไอมีเสมหะ และต้องใช้ยาปฏิชีวนะติดต่อกันอย่างน้อย 5 วัน

3. สำหรับเด็กเล็ก หรือคนแก่ อาจไม่ต้องกินยาแต่ ให้นอนพักผ่อน กินอาหารอ่อน ๆ และดื่มน้ำมาก ๆ
ข้อห้าม ห้ามดื่มสุราเมื่อกินยานี้ เพราะยาจะเสริมฤทธิ์กับแอลกอฮอล์

ยาขยัน (ยาหอม, ยาแก้วัง, ยาเพิ่มกำลัง)

แอมเฟตตามีน (Amphetamine)

ยานี้กินแล้วทำให้นอนไม่หลับ ไม่ง่วง ที่จริงใช้เป็น

ยาแก้โรคประสาทและยาลดความอ้วนโดยทำให้เบื่ออาหาร ถ้า
 กินยาน้อย ๆ ไม่ก็สัปดาห์ ก็จะติดยาและต้องการมากขึ้น
 เพราะขนาดยาเท่าเดิมจะไม่ได้ผล เมื่อกินนาน ๆ จะเกิดประ-
 สาทหลอน หรือเกิดโรคจิตได้ เมื่อกินยาน้อาจทำให้หงุดหงิด
 อารมณ์เสีย สมองเสื่อม ร่างกายทรุดโทรม เพราะทำงาน
 หนัก ยามกินไม่ได้กิน ยามนอนไม่ได้นอน

ยานเป็นยาเสพติด การซื้อขายผิดกฎหมาย

ผู้ทำงานกลางคืนรู้จักยานี้ในชื่อ ยาม้า หรือยาขาว

ยาอ้วน

เพรดนิโซโลน (Prednisolone, Dexamethasone)

ยานี้มีคนเอามาใช้กันผิด ๆ โดยใช้เป็นยาทำให้อ้วน
 ซึ่งที่จริงแล้วมันไปทำให้บวม น้ำ ไม่ได้เกี่ยวกับการกระตุ้น
 ให้อยากกินอาหารเพิ่มขึ้น ดังนั้นคนที่กินยานี้มากและติดต่อกัน
 เป็นเวลานานจะมีอาการหน้าบวมเหมือนพระจันทร์ นอกจากนั้น
 ยังทำให้เกิดโรคอื่นอีกมาก เช่น ความต้านทานโรคลดลง โรค
 จิต โรคกระเพาะ กระดูกผุ ฯลฯ คือแทบทุกอย่างของร่างกาย
 จะเสียหมด

ยาระงับประสาท

เมื่อใช้ยานาน ๆ จะติดได้ และอาจเป็นอันตรายถึงตายได้ เมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ จะซึมเซา การตัดสินใจผิดปกติ อาจมีอาการชัก หรือบางชนิดทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอไม่มีแรงทำงาน ถ้าใช้ยามานานแล้วขาดยา ก็จะเกิดโรคจิตขั้นหนัก

ยาระบบทางเดินอาหาร

(Gastrointestinal Drug)

ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหารนี้เราอาจจะแยกออกได้เป็นหลายประเภทดังนี้

1. ยาแก้โรคกระเพาะ
2. ยาแก้โรคท้องร่วง ท้องเสีย
3. ยาแก้โรคท้องผูก ยาถ่าย

ยาแก้โรคกระเพาะ, ยาลดกรด (Antacid)

ยารักษาโรคกระเพาะ โดยทั่วไปหรือส่วนใหญ่ก็เป็นยาประเภทลดกรดในกระเพาะนั่นเอง ปรับระดับของกรดในกระเพาะอาหารให้พอดีแก่การย่อยอาหาร ไม่ให้มันน้อยหรือมากเกินไป ถ้าภายในกระเพาะอาหารมีกรดมาก พวกเราก็ก

ทราบพิษสงของกรดที่อยู่แล้วว่าเป็นอย่างไร กรดเมื่อมีมากเกินไป
ความจำเป็นที่จะใช้ช่วยในการย่อยอาหาร ส่วนที่เหลือก็จะทำ
หน้าที่กักกระเพาะอาหารให้เกิดแผล หรือถ้ามาก ๆ อาจทำ
ให้กระเพาะอาหารทะลุได้เช่นกัน บางครั้งอาจเกิดเป็นแผล
เรอรั้ง มีอาการปวดท้องอยู่เสมอ ๆ

ยาที่ใช้ลดกรดในกระเพาะ ไม่ควรทำลายฤทธิ์กรด
ได้ 100% ที่เดียว เพราะจะทำให้การย่อยอาหารในกระเพาะ
ไม่ดีและการทำงานของกระเพาะอาหารอาจหยุดชะงักลงก็ได้

การใช้ยาพวกลดกรด หรือยารักษาโรคกระเพาะบ่อยๆ
อาจทำให้เกิดเป็นโรคกระเพาะเรอรั้งได้กล่าวคือ เมื่อเราทาน
ยาลดกรดมากเกินไป ทำให้กรดเกลือ (HCl) ในกระเพาะมี
ไม่พอก็จะกระตุ้นร่างกายให้ผลิตกรดออกมาอย่างรวดเร็ว ก็จะมี
ไปกักกระเพาะเกิดเป็นโรคกระเพาะขึ้นอีก เราก็กินยาลด
กรดอีก เหตุการณ์ก็เกิดวนเวียนเช่นนี้เรื่อยไป

การใช้ยาทุกชนิดเมื่อใช้ในปริมาณที่ไม่พอเหมาะใช้
มากหรือน้อยเกินไป ย่อมไม่เกิดผล กลับจะได้รับโทษแทน มี
หลายคนเข้าใจผิดว่าการทานยาจำนวนมาก ๆ จะช่วยทำให้
หายเร็วขึ้น ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น แต่มันมีผลตรงข้ามคือ

ทำให้ตายเร็วขึ้นเพราะมีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้เนื่องจาก
ฤทธิ์ของยาที่ทานเกินขนาดนั้น

อาการข้างเคียง (side effect) ของการทานยาพวก
ลดกรดที่เกิดขึ้นและพบอยู่เสมอ ๆ มีดังนี้

- มีอาการท้องร่วง (diarrhea)
- ท้องผูก (Constipation)
- อูจาระเหลว (Tical Impaction)
- เกิดสภาวะเป็นด่างมากเกินไป (Alkali syndrome)

ซึ่งเป็นอาการที่ร้ายแรงที่สุดเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้อง
ผูก เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ มึนงง อ่อนเพลีย กระจายน้ำ
ถ่ายปัสสาวะบ่อย มักเกิดขึ้นภายใน 1 สัปดาห์หลังจากให้ยา
จะมีอาการรุนแรงในคนที่เป็โรคไต

วิธีแก้ ควรหยุดใช้ยาลดกรดชนิดนั้น ๆ เสีย ควรให้
ยาพวกต่าง ๆ ที่ไม่ถูกดูดซึม (non-adsorbable alkali) แทน
เช่น อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์

ยาลดกรดในกระเพาะแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

1. Systemic antacid เป็นยาลดกรดในกระเพาะ
ที่มีผลต่อระบบอื่น ๆ ของร่างกาย ยาพวกนี้มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงความเป็นกรดและด่างในร่างกาย ยาลดกรดที่มี
พวกโซเดียมอยู่มักทำให้เกิด โรคหัวใจบวม (congestive
heart failure) ด้วย

2. Non systemic antacid ยาพวกนี้ไม่มีผลต่อ
ระบบอื่น ๆ ของร่างกาย สามารถลดกรดในกระเพาะโดย
เพิ่มความเป็นด่างขึ้น (เพิ่ม pH ให้ได้ประมาณ 4)

ข้อแนะนำ ถ้าไม่อยากเป็นโรคกระเพาะ ควรรับประทาน
อาหารให้ตรงเวลา และอย่าอดทนเมื่อหิวไว้ นานๆ จะ
เป็นเหตุให้เกิดโรคกระเพาะได้

ยาท้องเสีย, ท้องร่วง

โรคท้องเสีย ท้องร่วง เกิดขึ้นได้มากมายหลายสาเหตุ
ด้วยกันเป็นต้นว่า

— รับประทานอาหารที่มีเชื้อโรค ส่วนใหญ่ในเมือง
ไทยเกิดเนื่องจากสาเหตุนี้ ซึ่งเชื้อโรคก็มีหลายชนิด ดังนั้น
จึงต้องทราบว่าเกิดจากเชื้อโรคตัวใด ทางที่ดีที่สุดคือ ปรึกษา
แพทย์ ในรายที่เกิดท้องร่วง ท้องเสียเนื่องจากเชื้อโรค

— เกิดความผิดปกติทางใจ

— ดื่มน้ำไม่ดี

— เป็นโรคประสาท

นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุอื่น ๆ อีกมาก ทางที่ดีที่สุดเมื่อเกิดอาการท้องร่วงท้องเสียควรปรึกษาแพทย์ ถ้าไปไม่ทันให้ทานยาระงับไวรั่วคราก่อน แล้วรีบไปหาแพทย์ทันที จะปลอดภัย

เมื่อเกิดอาการท้องเสีย อาจทำให้จิตใจไม่สงบได้ สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงให้มากในคนไข้ที่เป็นโรคท้องร่วงท้องเสียก็คือ เรื่องอาหารการกิน ควรจำกัดอาหารโดยเฉพาะอาหารที่เป็นของแข็งไม่ควรให้คนไข้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอาการท้องร่วงท้องเสีย ถ้าเป็นท้องร่วงอย่างเฉียบพลันหรือเป็นท้องร่วงเรื้อรัง ควรให้อาหารอ่อนที่มีรสหวานผสมลงในนม เนยแก่คนไข้ และควรให้วิตามินร่วมด้วย แต่ควรให้ภายใน 24 ชั่วโมง ที่เกิดอาการท้องร่วงท้องเสียเพื่อให้ลำไส้ ได้พักฟื้น

ควรงดอาหารประเภทผัก ผลไม้สด พริก กาแฟ เหล้า เป็นต้น เพราะมีกากมาก

การรักษาทั่ว ๆ ไปมักให้ยาที่ลดการเคลื่อนไหวของลำไส้ เช่น Lomotil (Diphenoxylate Hydrochloride) การทานยาพวกนี้มักเกิดอาการท้องผูก จึงมักทานยาระบายตามไปด้วย

ยาบางอย่างจะไปดูดสารพวกเป็นพิษของเชื้อโรค (เช่น Kaolin, Pectin, Activated charcoal) ซึ่งยาพวกนั้นจะมีผลทำให้ไวตามินและเกลือแร่ต่าง ๆ สูญเสีย นอกจากนั้นยาพวกนี้ยังดูดน้ำ เมื่อยาพวกนี้ถูกน้ำจะเกิดแข็งเป็นก้อนคล้ายซีเมนต์อยู่ในลำไส้ ทำให้การดูดซึมอาหารเข้าลำไส้ลดลงอีกด้วย

อาการท้องร่วงท้องเสีย ขอแนะนำว่าถ้าเกิดขึ้นกับผู้ใดถ้าไม่แน่ใจ ควรปรึกษาแพทย์ อย่างหนึ่งนอนใจ มิฉะนั้นคุณอาจจะได้นอนทั้งใจ และกาย ช่วงเวลาปวดสั่นก็ได้ เช่น อหิวาต์

ขอแนะนำ ถ้าทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดท้องร่วงท้องเสีย เช่น ผิดปกติทางจิตใจ ควรพยายามทำให้ปกติแล้วจะหายได้ ถ้าเกี่ยวกับเชื้อโรค ควรทานอาหารที่สะอาดถูกอนามัย ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม หรือขายตามทางเท้า ถ้าเกี่ยวกับระบบประสาทควรระวังสติอารมณ์ และปรึกษาจิตแพทย์ รักษาประสาทให้ปกติเสีย

ยารักษาโรคท้องผูก, ยาถ่าย

เรื่องโรคท้องผูกกับยาถ่ายนั้น ขอกล่าวรวมกันไปเลยทีเดียว เพราะว่าเมื่ออาการท้องผูกบางครั้งจำเป็นต้องใช้ยา

ถ่าย ยาระบาย แต่ทางที่ดีที่สุด ถ้าไม่จำเป็นขอแนะนำว่า
ไม่ควรใช้ เพราะจะทำให้ติดยึด เกิดความเคยชิน ต้อง
ใช้ประจำ

โรคท้องผูกเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุเช่น

- ดื่มน้ำน้อยเกินไป
- ออกกำลังกายเกินไป
- ประสาทตึงเครียด
- เกิดความกังวล
- ใช้ยาระบายจนเคย

— คนแก่ มักท้องผูกเสมอ เนื่องจากการเคลื่อนไหว
ของลำไส้ลดลง ทำให้มีการกักอาหารแห้งแข็งอยู่ จึงถ่าย
ยากกว่าปกติ ควรทานผลไม้ที่ช่วยระบายด้วยจะเป็นการดี
เช่น ส้ม มะละกอ, ฯลฯ

การแก้โรคท้องผูกมักแก้ที่สาเหตุ โดยการกินอาหารที่
มีกากมาก ๆ ได้แก่ ผัก, ผลไม้, วุ้น, แมลงลัก, ควรดื่มน้ำมาก ๆ
และออกกำลังกายบ้าง

ยาแก้โรคท้องผูก, ยาถ่าย, ยาระบายที่นิยมใช้มี 3 ประเภท

1. Laxative ยาพวกนี้เป็นพวกที่ไปกระตุ้นให้เพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่ ทำให้อุจจาระไม่แข็งจนเกินไป ได้แก่ น้ำมันละหุ่ง (Castor oil) โบรมะขามแขก (Senokot tab) ยาดำ (Aloe) Phenolphthalein (Brooklax, Agarol, Veracolatate) Bisacodyl (Dulcolax)

โดยเฉพาะ Bisacodyl (Dulcolax) ใช้ในคนไข้ก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด และใช้กับอาการท้องผูกทุกชนิดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ยานี้ใช้ได้ปลอดภัยและลดความรำคาญของคนไข้ได้ ใช้ได้ทั้งทางปากและใช้ได้โดยทางเหน็บทวาร

ยาพวก Laxative ห้ามใช้ในคนที่ เป็นโรคเกี่ยวกับอวัยวะภายในช่องท้อง เช่น ไส้ติ่งอักเสบ, ลำไส้อุดตัน, ปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน

วิธีใช้ยาพวกนี้ ห้ามเคี้ยว ห้ามกินกับยาลดกรดหรือทานกับนม เพราะจะทำให้ยานี้แตกตัวในกระเพาะ ก่อให้เกิดการระคายเคืองมาก ถ้ายารสไม่ดีจะทานกับน้ำผลไม้ก็ได้

อาการข้างเคียง (side effect) ยาพวกนี้อาจเกิด Abdominal cramps โดยเฉพาะคนที่เป็โรคท้องผูกอย่างแรง เช่นยา Bisacodyl (Dulcolax), ถ้าทานมากเกินไป อาจเกิดการแพ้ตามผิวหนัง เช่น Brooklax

2. Cathartic พวกนี้จะไปเพิ่มจำนวนกากอาหาร เช่น วุ้น, แม่งลัก มันจะดูดน้ำแล้วพองตัวขึ้น เป็นการเพิ่ม bulk นนเอง

3. Purgative ยาพวกนี้จะทำให้กากอาหารอ่อนตัวลงช่วยหล่อลื่นทำให้การถ่ายอุจจาระง่ายขึ้น ยาพวกนี้เป็นพวก mineral oil หรือทางการค้าเรียก Agarol ถ้าใช้นานๆ จะทำให้เกิด fat soluble Vitamin deficiency (กล่าวคือ ทำให้ Vitamin ที่จะละลายอยู่ในไขมัน กลับมาละลายใน Mineral oil แล้วถูกขับออกไป เกิดโรคขาด Vitamin ได้)

ไม่ควรทานยาพวก mineral oil กับพวก surface active agent เพราะจะทำให้ mineral oil ถูก absorbed แล้วจะเป็นพิษต่อร่างกาย

วิธีใช้ยา การทานยาถ่ายควรทานก่อนนอนเพื่อจะได้ถ่ายได้สบายในตอนเช้า

ข้อแนะนำ ถ้าไม่ต้องการให้เกิดโรคท้องผูก ควร
 หักถ่ายให้เป็นเวลา เช่น ทุกเช้า ทุกเย็น หรือทุกเช้าก่นา
 จะเพียงพอสำหรับวันหนึ่ง ๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการใช้ยา
 ถ่ายก็ไม่มีพิษอะไร แต่ไม่ควรใช้บ่อยเกินไป จะทำให้ถ่าย
 ไม่ออกเมื่อเลิกใช้ การถ่ายอุจจาระยาก เมื่ออุจจาระแข็ง
 เกินไป จะทำให้เกิดโรคริดสีดวงทวารได้ เพราะก้อนอุจจาระ
 จะไปดันเส้นเลือดบริเวณทวารให้ปูดออกมา นาน ๆ เข้าอาจ
 ปรีแตกมีเลือดออกมา

ยาเสพติดบางตัวที่น่ารู้จัก

1. กัญชา (marihuana) ส่วนที่นำมาใช้คือ ยอด
 ช่อดอกที่แห้ง ๆ

การใช้ เคยใช้ในการรักษาและมันมีฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย (antibacterial activity)

ฤทธิ์ข้างเคียง ทำให้ประสาทมันง คอแห้ง อยาก
 ทานของหวาน ๆ หรือของที่เป็นน้ำ รับประทานอาหารไม่รู้
 จกอิ่ม หนึ่งตาถ่วงลง ตกใจง่าย มันง คลื่นไส้ เห็นหรือ
 คิดอะไรน่าขนไปหมดโดยไม่มีเหตุผล

อาการที่เกิดขึ้นเนื่องจากสับสนกัญชา จะสร้างได้เร็วกว่า
การรับประทาน

2. ฝิ่น (opium) ประกอบด้วยมอร์ฟีนถึง 10% ตั้ง
นั้น จึงมีผลเหมือนมอร์ฟีน

การใช้ เข้ายารักษาโรคแก้ปวด แก้ไอ หรือท้อง
ร่วง แพทย์ผู้จะใช้จะต้องตัดสินใจระหว่างผลประโยชน์ที่จะได้
กับราคาและการเสี่ยงของคนไข้ ซึ่งขึ้นอยู่กับอาการของโรค
นอกจากนี้ ยังใช้เข้ายารักษาโรคท้องร่วง เป็นบิด (dysen-
teries) เช่นทิงเจอร์ ฝิ่น (Opium Tincture)

ข้อควรระวัง ยาที่มี ฝิ่นต้องจ่ายตามคำสั่งแพทย์หรือ
ได้รับคำปรึกษาจากเภสัชกร

3. มอร์ฟีน (Morphine)

การใช้ แก้ปวด (analgesic) เกิดการกดระบบหายใจ
(depress respiration) แก้ไอ แก้หืด แก้ท้องผูก รักษาท้อง
ร่วง (diarrhea) รักษาบิด (dysenteries) ผลทำให้ใช้แก้
ฤทธิ์ข้างเคียง อาการดังกล่าวนี้ เนื่องจากผลของมอร์ฟีน
ต่อระบบประสาท ไม่ใช่ผลต่อเชื้อโรค เกิดจากการทานมาก
เกินไป อาจหมดสติ หรืออาจถึงการหายใจถูกกดทำให้ตายได้

ข้อควรระวัง การจ่ายควรจ่ายตามคำสั่งแพทย์ หรือ
ได้รับคำปรึกษาจากเภสัชกร

4. เฮโรอีน (Heroin) ได้จากการสังเคราะห์มา
จากพวคมอร์ฟีน มีฤทธิ์ร้ายแรงกว่ามอร์ฟีนมาก คนที่สูบ
เฮโรอีนจะมีอาการคล้ายกับสูบบุหรี่หรือนิคมอร์ฟีน แต่ติดง่าย
กว่าและรักษายากกว่าอันตรายก็มาก คนที่ติดเฮโรอีนจะทำให้
เกิดโรค Abstinence syndrome คือ มีอาการน้ำตาไหล
น้ำมูกที่ออกมาใส หาว เหงื่อออก นอนไม่หลับ มีอาการสั่น
กระตุก หลังจากหมดฤทธิ์ของเฮโรอีน อาจเกิดอาการอ่อน
เพลีย ปวดท้อง อาเจียน ท้องร่วงอย่างแรง หาว ปวดกล้ามเนื้อ
เหน็ด เหนื่อยหลัง ความดันโลหิตเพิ่ม ชีพจรเต้นเร็วขึ้น ผิว
หนังเย็น ถ้าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เฮโรอีนอีกหลังจากที่ติดแล้ว อาจ
เกิดอาการลงแดงตายได้

5. LSD (D Lysergic acid diethylamide) มีลักษณะ
เป็นผงสีขาว หรืออาจ เป็นของเหลวใส บางครั้งอาจอยู่ใน
รูปยาเม็ด บางครั้งก็เคลือบน้ำตาลรับประทาน บางคนหยด
ไว้บนแสตมป์หรือของจดหมายเพื่อที่จะใช้เสีย

การใช้ แต่ก่อนใช้เป็นยารักษาโรคจิต และโรคร้ายแรงประสาทอื่น ๆ แต่ปัจจุบันพบว่าไม่ได้ผล และยังถือว่า เป็นยาเสพติดผิดกฎหมายอีกด้วย

ฤทธิ์ข้างเคียง เมื่อทานยานี้แล้วจะเกิดประสาทหลอน เห็นเป็นภาพสีต่าง ๆ ผ่านตาไปมา เห็นวัตถุขยายใหญ่ผิด ปกติหรือเล็กลงกว่าปกติ

ยามักเรียกว่า “Tripying” (แปลว่า การเดินทาง) เพราะหลังจากทาน LSD เข้าไปจะเสมือนหนึ่งว่าได้ไป (Trip) ท่องเที่ยว อาจเป็นไปในทางที่ดีหรือร้ายก็ได้ เช่น ถ้ามีการ เดินทางที่ดีก็เสมือนว่า ได้ ไป ในที่ ซึ่งสวยงาม มีเสียงดนตรี ที่ เพราะพรัง บางรายอาจมีการเดินทางร้าย เช่น คิดว่าตนเอง ถูกทำร้าย ทำให้ตกใจ เป็นต้น ผลของมันรุนแรงมากอาจ ทำให้ผู้ที่ทานยา LSD นั้นจดจำสิ่งใดในเหตุการณ์นั้น ๆ ไป ตลอดหลาย ๆ ปี ได้ บางครั้งผู้ที่ทาน LSD เข้าไปจะคิดว่า เขาเองมีความสามารถพิเศษ เช่น บินได้ โดดตึกสูง ๆ ได้ เดินบนน้ำได้ซึ่งทำให้เกิดอันตรายแก่ตนเองถึงตายได้

ถึงแม้ว่า LSD ทานแล้วไม่ติด แต่ยานี้มีฤทธิ์ร้ายแรง มาก แม้จะรับประทานเพียงครั้งเดียวก็ตาม

ข้อแนะนำ ห้ามทานโดยเด็ดขาด ไม่ควรดื่มใด ๆ
 ๕๕
 ทงสน

6. Seconal (secobarbital USP)

การใช้ ใช้เป็นยานอนหลับ (Hypnotic)

ฤทธิ์ข้างเคียง ทำให้ความคิดสับสน ความดันโลหิต
 ต่ำ หัวใจเต้นเร็ว ทำให้สลบได้ ผิวหนังขน ถ้าเป็นเรอ
 รังจะปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ความจำเสื่อม

วิธีแก้ ให้ ออกซิเจน ยากกระตุ้นหัวใจ ฉีดกลูโคส

7. Cantharidin (Spanish Fly)

การใช้ ใช้เป็นยาเร่งกำหนัด กระตุ้นเซ็กส์ โดยการทำให้
 ทางเดินปัสสาวะของชายระคายเคือง

ฤทธิ์ข้างเคียง ถ้ากินทางปาก จะทำให้อาเจียน ปวดท้อง
 และช็อคได้ นอกจากนั้นยังทำให้ท้องเดินอย่าง
 แรง ปัสสาวะบ่อย ๆ ปัสสาวะลำบากขัดและ
 ปวด อาจมีโลหิตออกมาด้วยทำให้อวัยวะ
 เพศแข็งตัวผิดปกติ มีอาการปวด ขานมผล
 เสียโดยตรงต่อไต และอาจทำให้ตายได้
 เนื่องจากไตพิการ □□

พิมพ์ที่ ร.พ. ประเสริฐศิริ ขอยม่นสิน 3 อรุพงษ์ กรุงเทพฯ
คัมสิน ฤทธิศรี ผู้พิมพ์โฆษณา โทร. 2817650

